

**TRAGEN SIE DIESEN AUSWEIS
STÄNDIG BEI SICH.**

Zeigen Sie diesen Ausweis
Ihrem Apotheker,
Ihrem Zahnarzt und allen
Ärzten, die Sie behandeln.

Ich werde mit dem
Antikoagulans Elikvis®
(Apixaban) behandelt,
um der Entstehung
von Blutgerinnseln
vorzubeugen.

432-AT-2100048
05/2021



Bitte füllen Sie diesen
Abschnitt aus oder bitten
Sie Ihren Arzt darum.

Name:

.....
.....

Geburtsdatum:

.....
.....
.....
.....
.....

Indikation:

Dosierung: mg 2x täglich

Kontaktdaten des Arztes:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



**PATIENTEN-
AUSWEIS**



Information für PATIENTEN

- Nehmen Sie Eliquis® regelmäßig nach den Anweisungen Ihres Arztes ein. Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie die Tablette, sobald Sie es bemerken, und setzen Sie danach die Einnahme wie gewohnt fort.
- Brechen Sie die Behandlung mit Eliquis® nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen das Risiko eines Schlaganfalls oder anderer Komplikationen besteht.
- Eliquis® hilft, Ihr Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.

- Anzeichen und Symptome von Blutungen können z.B. Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.
- **Suchen Sie umgehend einen Arzt auf**, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbständig aufhört.
- Falls bei Ihnen eine Operation oder ein invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation Ihren behandelnden Arzt, dass Sie Eliquis® einnehmen.

Information für ARZT UND APOTHEKER

- Eliquis® (Apixaban) ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Eliquis® kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Eliquis® unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Eliquis® erfordert keine Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer Anti-Faktor-Xa-Test kann in Ausnahmesituationen, z.B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein.

Gerinnungstests wie Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) sind nicht empfohlen – siehe Fachinformation.

- Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-Faktor-Xa-Aktivität von Apixaban ist verfügbar.