

- 1** 有些孩子天生唇腭裂 一有的嘴唇上有孔洞、间隙或裂缝,有的口腔里的上方有裂缝(这可能从外面看不出来)。



- 2** 手术治疗非常重要的 因为不做手术, 患儿可能不能正常说话, 可能导致感染率增加, 也可能难以正常地进食和喝奶。



- 3** 微笑列车的外科医生可以在微笑列车的合作医院免费修复这个缺陷。手术是修复这个缺陷的唯一途径。



- 4** 为使患儿健壮到可以接受手术, 喂饱他们是非常重要的。



- 5** 但是 - 有时给唇腭裂患儿喂食是很困难的, 因为奶会从鼻子流出, 甚至可能会进入肺部。或者患儿可能会吸入空气, 这让他们觉得已经吃饱了, 然后入睡, 但他们并没有得到足够的营养。




6 为使患儿能够接受手术，让他获得足够的营养非常重要。妈妈们必须努力尝试不同的喂养策略，以找到她和她的孩子适用的方法。如有可能，最好是直接从乳房喂养孩子。可能的策略有：



让患儿坐着喂。



将乳房置于婴儿嘴唇完整的一侧。



轻轻挤压乳房，以增加乳汁的流量。



比正常情况更频繁地喂食与拍嗝。

7 如果不能从乳房喂养患儿，母亲则需用其他方法喂养婴儿，可能的策略有：



母亲可将奶水从乳房挤入汤匙或瓶子中，并使用汤匙或瓶子喂养患儿。



母亲可以稍稍把奶嘴的孔扩大，以增加牛奶的流量。

8 如果没有母乳，母亲可以用牛奶或配方奶粉喂食患儿。确保牛奶和配方奶粉是被煮沸后再冷却的。



9 确保任何用于喂食的器皿的清洁，并且在水中至少煮沸 10 分钟以进行消毒。不干净的勺子和瓶子可导致发热和感染。



10 请不要忘记带您的宝宝到最近的微笑列车项目合作医院。医生会检查您的孩子，并且告诉您什么时候来医院进行手术。

在微笑列车：项目资助的手术是免费的。

