

Informasi untuk Orangtua Selama Operasi Bibir Sumbing dan Langit-langit

Anak Anda akan segera menjalani operasi untuk memperbaiki bibir sumbing dan langit-langitnya. Meskipun operasi bibir sumbing merupakan operasi rutin, selalu ada kemungkinan terjadi komplikasi.




Mohon beritahu dokter Smile Train Anda apabila anak Anda menunjukkan gejala pilek, batuk, atau gejala panas dan berkeringat. Gejala ini merupakan risiko besar bagi kesehatan dan keselamatannya selama dan sesudah operasi.


Pastikan bahwa anak Anda tidak makan atau minum APAPUN selama 6 jam sebelum operasi (tidak juga air atau air susu ibu (ASI)).



Memberi makan anak sebelum operasi bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa seperti tersedak atau muntah selama operasi.



Ketika Anda menemui anak Anda setelah operasi dia sedang mengalami pemulihan dan kemungkinan terlihat mengantuk atau menangis lebih dari biasanya, mengalami pembengkakan atau berdarah sedikit di sekitar luka operasi. Ini adalah normal.




Setelah anak Anda mengalami operasi, **JANGAN** mencoba memberi makan apapun kepada anak Anda, juga tidak air atau ASI, karena makanan ini bisa masuk ke paru-parunya dan menyebabkan batuk atau tersedak. Dokter Anda akan menyatakan kapan Anda dapat memberi makan kepada anak Anda dengan aman. **Di ruang pemulihan, pastikan bahwa anak Anda berbaring dalam posisi miring, karena ini akan memastikan bahwa dia dapat bernafas secara benar setelah operasi.**



Beritahu dokter/perawat Anda apabila anak Anda menunjukkan gejala sulit bernafas, perdarahan berlebihan dari luka operasi, panas dan berkeringat, muntah, sangat mengantuk dan apabila jarum infus lepas dari tangannya atau cairan infus habis.



Ketika anak Anda boleh pulang dari rumah sakit, dokter atau perawat Anda akan memberi Anda instruksi penting tentang cara merawat anak Anda di rumah. Apabila Anda melihat masalah setelah meninggalkan rumah sakit, bawalah anak Anda kembali ke rumah sakit dengan segera untuk evaluasi .



Bersama-sama, para tenaga medis profesional dan orangtua bisa membantu memastikan bahwa operasi akan aman dan sukses.

Mohon merujuk anak-anak lain yang mengalami bibir sumbing/langit-langit ke dokter Smile Train Anda.