

کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کھلانے کی سفارشات

1 بعض بچے ایک کلیفٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ہونٹ میں ایک سوراخ، ایک شگاف، یا درز یا ان کے منہ کی چہت میں ایک سوراخ ہوتا ہے جو، باہر سے دکھائی نہ دے



درار تالو

دو طرفہ درار ہونٹ اور تالو

درار ہونٹ اور تالو

درار ہونٹ



یکطرفہ درار ہونٹ

2 **سرجری بہت اہم ہے** کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بغیر بچہ درست طور پر بول نہ سکے، اس کو انفیکشنوں کا خطرہ بڑھ جائے اور ہو سکتا ہے اسے خوراک لینے اور دودھ پینے میں مسائل درپیش ہوں۔



4 **سرجری کروانے کی خاطر** کافی تندرست اور مضبوط ہونے کے لئے ضروری ہے کہ کلیفٹ کے حامل ننھے بچوں کو مناسب خوراک دی جائے۔


3 **ایک سمانٹل ٹرین سرجن ایک سمانٹل ٹرین پارٹنر** ہسپتال میں اس نقص کو مفت دور کر سکتا ہے۔ اس نقص کو پوری طرح دور کرنے کا واحد طریقہ سرجری ہے۔



5 **لیکن بعض اوقات کلیفٹ کے حامل بچوں کو دودھ پلانا مشکل ہوتا ہے** کیونکہ دودھ ان کی ناک سے باہر آسکتا ہے بلکہ ان کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے۔ یا بچے ہوا اندر کھینچ سکتے ہیں، اور وہ سیر ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں اور سو جاتے ہیں، چاہے ان کو کافی غذائیت نہ ملی ہو۔



6 یہ ضروری ہے کہ بچے کو اچھی غذا ملے تاکہ اس کی سرجری ہو سکے۔ ماؤں کو یہ دیکھنے کے لئے کہ ان کے لئے اور بچے کے لئے کون سا طریقہ کام کرتا ہے، دودھ پلانے کی مختلف تدابیر آزمائی جائیں۔ اگر ممکن ہو، تو بچے کو براہ راست چھاتی سے دودھ پلانا بہترین ہے۔ کچھ تدابیر یہ ہیں:



بچوں کو معمول سے زیادہ کثرت کے ساتھ دودھ پلائیں اور ڈکار دلوائیں۔

دودھ کی روانی کو بڑھانے کے لئے چھاتی کو آرام سے دبائیں۔

نیل کو منہ کی اُس جانب پر رکھیں جو کئی ہوئی نہیں ہے۔

بچے کو سیدھا بٹھا کر دودھ پلائیں۔

7 اگر چھاتی سے دودھ پلانا ممکن نہ ہو تو یہ لازمی ہے کہ ماں دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہوئے بچے کو دودھ پلانا جاری رکھے۔ چند تدابیر یہ ہیں:




ماں بچے کو ایک چمچ یا بوتل سے دودھ پلانے کے لئے چھاتی سے دودھ نکال سکتی ہے۔

ماں دودھ کی روانی کو بڑھانے کے لئے دودھ پلانے والی بوتل کے نیل کے سوراخ کو تھوڑا بڑا کر سکتی ہے۔

8 اگر ماں کا دودھ بالکل بھی دستیاب نہ ہو، تجارتی فارمولا اگلا بہترین انتخاب ہے لیکن لازماً دستکار کی ہدایات کے مطابق احتیاط کے ساتھ تیار کرنا چاہیئے۔ گاڑے کا دودھ صرف اس وقت آخری انتخاب ہوگا جب ماں کا دودھ بھی دستیاب نہ ہو اور نہ ہی فارمولا دودھ دستیاب ہو۔

9 یہ یقینی بنائیں کہ دودھ پلانے کے لئے استعمال کئے جانے والے آلات صاف اور پانی میں کم از کم 10 منٹ تک ابال کر جراثیم سے پاک کئے گئے ہوں۔ گندے چمچوں اور بوتلوں کے نتیجے میں بخار اور انفیکشن ہو سکتی ہے۔



10 براہ مہربانی اپنے بچے کو نزدیک ترین سمانل ٹرین سنٹر پر لے جانا نہ بھولیں۔ سنٹر پر ایک ڈاکٹر بچے کا معائنہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ سرجری کے لئے کب ہسپتال آئیں۔

