

Analysis I

Vorlesung 4

Wenn ich weiter geblickt
habe, so deshalb, weil ich auf
den Schultern von Riesen
stehe

Isaac Newton

Angeordnete Körper

Zwei reelle Zahlen kann man ihrer Größe nach vergleichen, d.h. die eine ist größer als die andere oder es handelt sich um die gleiche Zahl. Auf der Zahlengeraden bedeutet dies, dass die eine Zahl rechts von der anderen liegt. Die wesentlichen Eigenschaften der Größerbeziehung werden im Begriff des angeordneten Körpers zusammengefasst. Um dieses Konzept formulieren zu können, führen wir kurz die grundlegenden Begriffe Relation und Ordnungsrelation ein.

DEFINITION 4.1. Es seien X und Y Mengen. Eine *Relation* zwischen X und Y ist eine Teilmenge $R \subseteq X \times Y$.

D.h. bei einer Relation stehen gewisse Paare (x, y) in der gegebenen Relation, und die anderen Paare eben nicht. Man schreibt dafür $(x, y) \in R$ oder $R(x, y)$ oder xRy . Im Moment sind wir an Ordnungsrelationen interessiert, die folgendermaßen definiert werden.

DEFINITION 4.2. Eine Relation \preccurlyeq auf einer Menge I heißt *Ordnungsrelation* oder *Ordnung*, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind.

- (1) Es ist $i \preccurlyeq i$ für alle $i \in I$.
- (2) Aus $i \preccurlyeq j$ und $j \preccurlyeq k$ folgt stets $i \preccurlyeq k$.
- (3) Aus $i \preccurlyeq j$ und $j \preccurlyeq i$ folgt $i = j$.

DEFINITION 4.3. Eine Ordnungsrelation \preccurlyeq auf einer Menge I heißt *lineare Ordnung* (oder *totale Ordnung*), wenn zu je zwei Elementen $x, y \in I$ die Beziehung $x \preccurlyeq y$ oder $y \preccurlyeq x$ gilt.

Wenn auf einer Menge M eine totale Ordnung vorliegt, so bezeichnet man für zwei Elemente $x, y \in M$ das kleinere der beiden mit $\min(x, y)$ und das größere mit $\max(x, y)$. Man spricht vom *Minimum* und vom *Maximum*.

DEFINITION 4.4. Ein Körper K heißt *angeordnet*, wenn es eine totale Ordnung \geq auf K gibt, die die beiden Eigenschaften

- (1) Aus $a \geq b$ folgt $a + c \geq b + c$ (für beliebige $a, b, c \in K$),
- (2) Aus $a \geq 0$ und $b \geq 0$ folgt $ab \geq 0$ (für beliebige $a, b \in K$),

erfüllt.

Statt $a \geq b$ schreibt man auch $b \leq a$. Die Schreibweise $a > b$ bedeutet $a \geq b$ und $a \neq b$. Eine wichtige Beziehung in einem angeordneten Körper ist, dass $a \geq b$ äquivalent zu $a - b \geq 0$ ist. Diese Äquivalenz ergibt sich durch beidseitiges Addieren von $-b$ bzw. b aus dem ersten Axiom. In einem angeordneten Körper nennt man ein Element $a \in K$ *positiv*, wenn $a > 0$ ist, und *negativ*,¹ wenn $a < 0$ ist. Die 0 ist demnach weder positiv noch negativ, und jedes Element ist entweder positiv oder negativ oder 0. Die Elemente a mit $a \geq 0$ nennt man dann einfach *nichtnegativ* und die Elemente a mit $a \leq 0$ *nichtpositiv*. Für die entsprechenden Mengen schreibt man

$$K_+, K_-, K_{\geq 0} = K_+^0, K_{\leq 0} = K_-^0$$

oder Ähnliches. Die wichtigsten Beispiele für angeordnete Körper sind der Körper der rationalen Zahlen \mathbb{Q} und der Körper der reellen Zahlen \mathbb{R} .

LEMMA 4.5. *In einem angeordneten Körper gelten die folgenden Eigenschaften.*

- (1) $1 \geq 0$.
- (2) *Es ist $a \geq 0$ genau dann, wenn $-a \leq 0$ ist.*
- (3) *Es ist $a \geq b$ genau dann, wenn $a - b \geq 0$ ist.*
- (4) *Es ist $a \geq b$ genau dann, wenn $-a \leq -b$ ist.*
- (5) *Aus $a \geq b$ und $c \geq d$ folgt $a + c \geq b + d$.*
- (6) *Aus $a \geq b$ und $c \geq 0$ folgt $ac \geq bc$.*
- (7) *Aus $a \geq b$ und $c \leq 0$ folgt $ac \leq bc$.*
- (8) *Aus $a \geq b \geq 0$ und $c \geq d \geq 0$ folgt $ac \geq bd$.*
- (9) *Aus $a \geq 0$ und $b \leq 0$ folgt $ab \leq 0$.*
- (10) *Aus $a \leq 0$ und $b \leq 0$ folgt $ab \geq 0$.*

Beweis. Siehe Aufgabe 4.9. □

LEMMA 4.6. *In einem angeordneten Körper gelten die folgenden Eigenschaften.*

- (1) *Aus $x > 0$ folgt auch $x^{-1} > 0$.*
- (2) *Aus $x < 0$ folgt auch $x^{-1} < 0$.*

¹Man beachte, dass hier negativ in einem neuen Sinn auftritt. In jedem Körper K gibt zu jedem Element $x \in K$ das negative Element $-x$, also das Inverse von x bezüglich der Addition. Das Element $-x$ ist aber nicht in einem absoluten Sinn negativ, sondern nur in Bezug auf x . Dagegen gibt es in einem angeordneten Körper wirklich negative und positive Elemente.

- (3) Für $x > 0$ ist $x \geq 1$ genau dann, wenn $x^{-1} \leq 1$ ist.
- (4) Aus $x \geq y > 0$ folgt $x^{-1} \leq y^{-1}$.
- (5) Für positive Elemente x, y ist $x \geq y$ äquivalent zu $\frac{x}{y} \geq 1$.

Beweis. Siehe Aufgabe 4.11, Aufgabe 4., Aufgabe 4.12, Aufgabe 4.13 und Aufgabe 4.15. \square

DEFINITION 4.7. Es sei K ein angeordneter Körper. Zu $a, b \in K$, $a \leq b$, nennt man

- $[a, b] = \{x \in K \mid x \geq a \text{ und } x \leq b\}$ das *abgeschlossene Intervall*.
- $]a, b[= \{x \in K \mid x > a \text{ und } x < b\}$ das *offene Intervall*.
- $]a, b] = \{x \in K \mid x > a \text{ und } x \leq b\}$ das *linksseitig offene Intervall*.
- $[a, b[= \{x \in K \mid x \geq a \text{ und } x < b\}$ das *rechtsseitig offene Intervall*.

Für das offene Intervall wird häufig auch (a, b) geschrieben. Die Zahlen a und b heißen die *Grenzen des Intervalls*, genauer spricht man von oberer und unterer Grenze. Die Bezeichnung linksseitig und rechtsseitig bei den beiden letzten Intervallen (die man auch als *halboffen* bezeichnet) rühren von der üblichen Repräsentierung der reellen Zahlen als Zahlengerade her, bei der rechts die positiven Zahlen stehen. Zutreffender (also weniger konventionsverhaftet) wäre es von „größerseitig offen“ und „kleinerseitig offen“ zu sprechen. Manchmal werden auch Schreibweisen wie (a, ∞) verwendet. Dies bedeutet *nicht*, dass es in K ein Element ∞ gibt, sondern ist lediglich eine kurze Schreibweise für $\{x \in K \mid x > a\}$.

BEMERKUNG 4.8. Ein äquivalenter Zugang zum Begriff des angeordneten Körpers funktioniert so: Man hat einen Körper K , bei dem eine Teilmenge $P \subseteq K$ (die „positive Hälfte“) ausgezeichnet ist mit den folgenden Eigenschaften


- (1) Entweder $x \in P$ oder $-x \in P$ oder $x = 0$.
- (2) Aus $x, y \in P$ folgt $x + y \in P$.
- (3) Aus $x, y \in P$ folgt $x \cdot y \in P$.

In einem angeordneten Körper erfüllen die positiven Elemente diese Bedingungen. Man kann aber umgekehrt aus einem Körper mit einer solchen positiven Teilmenge einen angeordneten Körper machen, indem man

$$x \geq y \text{ durch } x = y \text{ oder } x - y \in P$$

definiert, siehe Aufgabe 4.37.

Der Betrag



DEFINITION 4.9. In einem angeordneten Körper K ist der *Betrag* eines Elementes $x \in K$ folgendermaßen definiert.

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0, \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Der Betrag ist also nie negativ (da aus $x < 0$ die Beziehung $-x > 0$ folgt, vergleiche Aufgabe 4.7) und hat nur bei $x = 0$ den Wert 0, sonst ist er immer positiv. Die Gesamtabbildung

$$K \longrightarrow K, x \longmapsto |x|,$$

nennt man auch *Betragsfunktion*. Der Funktionsgraph setzt sich aus zwei Halbgeraden zusammen; eine solche Funktion nennt man auch *stückweise linear*.

LEMMA 4.10. *Es sei K ein angeordneter Körper. Dann erfüllt die Betragsfunktion*

$$K \longrightarrow K, x \longmapsto |x|,$$


folgende Eigenschaften (dabei seien x, y beliebige Elemente in K).

- (1) *Es ist $|x| \geq 0$.*
- (2) *Es ist $|x| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$ ist.*
- (3) *Es ist $|x| = |y|$ genau dann, wenn $x = y$ oder $x = -y$ ist.*
- (4) *Es ist $|y - x| = |x - y|$.*
- (5) *Es ist $|xy| = |x| |y|$.*
- (6) *Für $x \neq 0$ ist $|x^{-1}| = |x|^{-1}$.*
- (7) *Es ist $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung für den Betrag).*
- (8) *Es ist $|x + y| \geq |x| - |y|$.*

Beweis. Siehe Aufgabe 4.31. □

Die Zahl $|x - y|$ nennt man auch den *Abstand* der beiden Zahlen x und y .

Bernoulli'sche Ungleichung



SATZ 4.11. *Es sei K ein angeordneter Körper und n eine natürliche Zahl. Dann gilt für jedes $x \in K$ mit $x \geq -1$ die Abschätzung*

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Beweis. Wir führen Induktion über n . Bei $n = 0$ steht beidseitig 1, so dass die Aussage gilt. Sei nun die Aussage für n bereits bewiesen. Dann ist

$$\begin{aligned} (1 + x)^{n+1} &= (1 + x)^n(1 + x) \\ &\geq (1 + nx)(1 + x) \\ &= 1 + (n + 1)x + nx^2 \\ &\geq 1 + (n + 1)x, \end{aligned}$$

da Quadrate (und positive Vielfache davon) in einem angeordneten Körper nichtnegativ sind. \square

Archimedisch angeordnete Körper

Wenn man sich wie üblich die reellen Zahlen als Zahlengerade vorstellt, so ist das nächste Axiom selbstverständlich. Es gibt aber auch sehr interessante angeordnete Körper, in denen dieses Axiom nicht gilt; es gilt auch nicht im Rahmen der sogenannten Nichtstandardanalysis.



Archimedes (ca. 287 -212 v. C.)

DEFINITION 4.12. Es sei K ein angeordneter Körper. Dann heißt K *archimedisch angeordnet*, wenn das folgende *Archimedische Axiom* gilt, d.h. wenn es zu jedem $x \in K$ eine natürliche Zahl n mit

$$n \geq x$$

gibt.

Diese Eigenschaft ist für negative Elemente stets erfüllt, für positive Elemente handelt es sich aber um eine echte neue Bedingung, die nicht jeder angeordnete Körper erfüllt. Die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen bilden jeweils einen archimedisch angeordneten Körper, ein nicht-archimedisch angeordneter Körper wird in Aufgabe 11.33 besprochen. Einen archimedisch angeordneten Körper kann man sich als eine *Zahlengerade* vorstellen, auf denen auch die ganzen Zahlen liegen. Mit Zahlengerade wird noch nichts genaues über „Lücken“ oder „Kontinuität“ behauptet.





Die folgende wichtige Aussage sollte man so lesen: Egal wie groß y ist und egal wie klein ein positives x ist, man kann stets mit hinreichend vielen x die Zahl y übertreffen. Egal wie kurz eine Strecke ist, wenn man sie hinreichend oft hintereinander legt, übertrifft man damit jede beliebig lange Strecke. Mit Sandkörnern beliebig kleiner Größe kann man eine beliebig große Sanddüne aufbauen.

LEMMA 4.13. *Es sei K ein archimedisch angeordneter Körper. Dann gibt es zu $x, y \in K$ mit $x > 0$ stets ein $n \in \mathbb{N}$ mit $nx > y$.*

Beweis. Wir betrachten y/x . Aufgrund des Archimedes-Axioms gibt es ein n mit $n \geq y/x$. Da x positiv ist, gilt nach Lemma 4.5 (6) auch $nx \geq y$. \square

LEMMA 4.14. *Es sei K ein archimedisch angeordneter Körper. Es sei $x > 0$. Dann gibt es eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} \leq x$.*

Beweis. Es ist x^{-1} eine nach Lemma 4.6 (1) positive Zahl und daher gibt es eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq x^{-1} > 0$. Dies ist nach Lemma 4.6 (4) äquivalent zu

$$\frac{1}{n} = n^{-1} \leq (x^{-1})^{-1} = x.$$

\square

Im folgenden Lemma verwenden wir, dass man zunächst die ganzen Zahlen \mathbb{Z} in einem angeordneten Körper K wiederfindet und dass man dann auch die rationalen Zahlen \mathbb{Q} in K wiederfindet. Die rationale Zahl n/m ist als das Element $n_K \cdot (m_K)^{-1}$ zu interpretieren, siehe auch Aufgabe 4.19.

LEMMA 4.15. *Es sei K ein archimedisch angeordneter Körper. Dann gibt es zwischen je zwei Elementen $x < y$ auch eine rationale Zahl n/k (mit $n \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}_+$) mit*

$$x < \frac{n}{k} < y.$$

Beweis. Wegen $y > x$ ist $y - x > 0$ und daher gibt es nach Lemma 4.14 ein $k \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{k} < y - x$. Nach Lemma 4.13 gibt es auch ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$n \frac{1}{k} > x$$

und ein $n' \in \mathbb{Z}_-$ mit

$$n' \frac{1}{k} \leq x.$$

Daher gibt es auch ein $n \in \mathbb{Z}$ derart, dass

$$n \frac{1}{k} > x \text{ und } (n-1) \frac{1}{k} \leq x$$

ist. Damit ist einerseits

$$x < \frac{n}{k}$$

und andererseits


$$\frac{n}{k} = \frac{n-1}{k} + \frac{1}{k} < x + y - x = y$$

wie gewünscht. □

In einem archimedisch angeordneten Körper bilden die ganzzahligen Intervalle $[n, n+1[$, $n \in \mathbb{Z}$, eine disjunkte Überdeckung, d.h. es ist

$$K = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n+1[$$

und $[m, m+1[\cap [n, n+1[= \emptyset$ für $m \neq n$. Deshalb ist die folgende Definition sinnvoll.



DEFINITION 4.16. Es sei K ein archimedisch angeordneter Körper. Die *Gaußklammer* ist die Funktion

$$[\]: K \longrightarrow K, x \longmapsto [x],$$

die durch

$$[x] = n, \text{ falls } x \in [n, n + 1[\text{ und } n \in \mathbb{Z},$$

definiert wird.

Da die Werte der Gaußklammer die ganzen Zahlen sind, kann man die Gaußklammer auch als eine Abbildung $K \rightarrow \mathbb{Z}$ auffassen.

LEMMA 4.17. *Es sei K ein archimedisch angeordneter Körper und $b > 1$. Dann gibt es zu jedem $S \in K$ eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit*

$$b^n \geq S.$$

Beweis. Wir schreiben $b = 1 + u$ mit $u > 0$. Aufgrund von Lemma 4.13 gibt es eine natürliche Zahl n mit $nu \geq S - 1$. Damit gilt unter Verwendung der Bernoulli-Ungleichung die Abschätzung

$$b^n = (1 + u)^n \geq 1 + nu \geq 1 + S - 1 = S.$$

□

Abbildungsverzeichnis

Quelle = Absolute value.svg , Autor = Benutzer Ævar Arnfjörð Bjarmason auf Commons, Lizenz = CC-by-sa 3.0	4
Quelle = Bernoulli inequality.svg , Autor = Benutzer Oleg Alexandrov auf Commons, Lizenz = gemeinfrei	5
Quelle = Archimedes (Idealportrait).jpg , Autor = Benutzer Ixitixel auf Commons, Lizenz = PD	6
Quelle = Zandlineaal-schuin.jpg , Autor = Benutzer Tom Meijer auf Commons, Lizenz = CC-by-sa 4.0	7
Quelle = Dune 7 in the Namib Desert.jpeg , Autor = Benutzer Ævar Arnfjörð Bjarmason auf Commons, Lizenz = CC-by-sa 3.0	7
Quelle = Floor function.svg , Autor = Benutzer Omegatron auf Commons, Lizenz = CC-by-sa 3.0	9
Erläuterung: Die in diesem Text verwendeten Bilder stammen aus Commons (also von http://commons.wikimedia.org) und haben eine Lizenz, die die Verwendung hier erlaubt. Die Bilder werden mit ihren Dateinamen auf Commons angeführt zusammen mit ihrem Autor bzw. Hochlader und der Lizenz.	11
Lizenzklärung: Diese Seite wurde von Holger Brenner alias Bocardodarapti auf der deutschsprachigen Wikiversity erstellt und unter die Lizenz CC-by-sa 3.0 gestellt.	11