

術後照護說明

感謝您為您的寵物絕育。您幫助減少了可能會流浪的動物數量，並且讓您的寵物更健康、更快樂！儘管絕育手術很常見，但也請注意，您的寵物剛剛接受了手術，它需要適當的照護才能更好地恢復。

注意：術後照護專線為 (844) MY-ASPCA [(844) 692-7722]。如果您在寵物接受手術後有任何疑問或顧慮，請撥打此號碼，並選擇與客戶服務代表交談的選項。**在為出現術後併發症的寵物尋求任何獸醫照護之前，您必須先撥打術後照護專線，該專線每週 7 天、每天 24 小時提供服務。**請注意，如果寵物的疾病或受傷狀況並非由絕育手術造成，ASPCA 概不承擔相關照護服務的費用。此外，如果照護者未遵循術後說明，ASPCA 可能不會承保複查約診和照護服務的費用。

麻醉和手術

請留意您的寵物在麻醉和/或手術恢復期間是否有任何異常跡象。這些跡象可能包括流血、嗜睡或虛弱、食欲不振/飲水減少、顫抖、步態不穩，且在手術 24 小時後持續存在。

如果您的寵物有嘔吐、腹瀉、呼吸困難或牙齦蒼白症狀，請立即撥打術後照護專線。

手術切口

手術部位無外部縫合線。所有縫合線均在皮膚下方。這些縫合線可自行溶解，所以無需依靠醫療協助來拆線。切口的兩側由醫用級膠水粘接。如果您的寵物配合檢查，請每天檢查手術部位，以確保傷口正在愈合。在寵物完成手術當天，您所看到的手術部位外觀即為正常狀態。如果手術部位異常發紅、有綠色/黃色或微紅分泌物、散發異味、有異物突起、摸著發熱，或有挫傷，或者有疑似在變大的腫塊，請撥打術後照護專線。

雄貓

雄貓手術部位的切口非常小，無需縫合或使用醫用級膠水粘接。其陰囊上可能會有一到兩個開口，屬於正常現象。

疫苗接種

如果您的寵物已接種疫苗，請留意疫苗接種部位（肩部/後腿），並檢查您的寵物是否有對疫苗產生反應的跡象。這些反應包括臉部腫脹、長蕁麻疹、跛行、流口水、皮膚瘙癢，或疫苗接種部位（肩部/後腿）疼痛或腫脹。如果您的寵物出現這些跡象，請撥打術後照護專線。

食物和水

在從診所回到家中約兩小時後，應為您的寵物提供約平常份量一半的食物和水。許多貓在從診所回到家中的當天晚上不會進食。

如果您的寵物年齡不足 16 週，請在到家後盡快給您的寵物餵食約平常份量一半的食物和水。如果您的幼貓到家後不吃東西，您在肯定自己不會被咬傷或抓傷的情況下，可以使用棉簽在其牙齦上塗抹一些槭糖漿或 Karo Syrup 玉米糖漿。

請勿為了餵食而取下 E-項圈，除非是您能夠在寵物不戴 E-項圈的情況下監督其進食。請在寵物進食完後，立即重新為其戴上 E-項圈。

止痛藥

您的寵物在做絕育手術的同時服用了長效止痛藥。請勿給您的寵物服用人類的藥物。這種行為很危險，且可能致命。

紋身

做過絕育手術的寵物會有一個綠色的小紋身。犬類的紋身在手術切口旁邊。紋身時使用的是無菌工具，所以一般不會引起併發症。雌貓的紋身在手術切口旁邊。雄貓的紋身位於下腹部。請留意紋身部位是否發紅、腫脹或有分泌物。如有此類情況，請撥打術後照護專線。

跳躍和玩耍

請在寵物接受手術後的七天內，限制其跳躍和玩耍。過量運動可能會導致手術部位裂開或腫脹。在您無法照看寵物時，請將其放在空間大小合適的籠子、狗舍、板條箱或小房間內。遛狗時請使用牽引繩，以便它們如廁。請勿帶狗長時間散步，或讓其與其他動物或人激烈玩鬧。除此之外，請勿讓您的寵物在傢俱上跳上跳下。

請讓您的寵物遠離其他動物

請讓已絕育的雄性動物遠離未絕育的雌性動物。已絕育的雄性動物在絕育手術後長達 30 天內仍然有可能使未絕育的雌性動物懷孕。請讓已絕育的雌性動物遠離想要與其交配的未絕育雄性動物。從絕育診所返回的動物還可能與家中的其他動物氣味不同。這可能會導致動物之間發生打鬥，所以請準備在寵物接受手術後的幾天內，將其安置在單獨的區域。

衛生習慣

留意您寵物的小便是否帶血。術後 24 小時內，雌性動物的小便可能會帶有少量血。如果小便持續帶血或如果您的寵物在任何時候有其他不適症狀，請撥打術後照護專線。

如果您的貓在絕育手術後 72 小時內排尿困難，請撥打術後照護專線。

給寵物洗澡

術後 10 天內，請勿給寵物洗澡。

寵物貓照護

術後到家時，請將貓安置在安靜、光線較暗的封閉空間內，例如衛生間。請注意，貓在手術後可能會把自己藏起來。建議將貓可以躲藏之處的通道全部堵住，以便您監督康復進程。

行為

給寵物做絕育手術可以減少某些不良行為，例如用尿做標記、交配、攻擊或噴尿行為，但是寵物可能早已習得這些行為，因此可能無法完全杜絕。寵物可能需要一些時間才能做到完全不再有此類行為。貓可能需要長達 30 天的時間才能完全停止噴尿或表現發情症狀。年老的雄貓可能會繼續噴尿，但其尿液不會再很難聞。