



Caring for Your Rabbit After Surgery

Thank you for spaying/neutering your rabbit. You have just helped to decrease the potential number of homeless animals and made your rabbit healthier and happier! Although spays and neuters are common procedures, please remember that your pet has just gone through surgery and needs appropriate care to properly recover.

Note: The postoperative care line can be reached at (844) MY-ASPCA, (844) 692-7722. If you have any questions or concerns after your pet has had surgery, call this number and choose the option that allows you to speak to a Client Services Representative. **Prior to seeking any veterinary care for a rabbit with a postoperative complication, you must contact the postoperative care line, which is available 24 hours a day/7 days a week.** Please be advised that if an animal's illness or injury is not related to the surgery, the ASPCA will not be responsible for costs associated with care. In addition, if postoperative instructions were not followed, the cost of the re-check appointment and care may not be covered by the ASPCA.

Anesthesia and Surgery

After taking your pet home, place them in a quiet, enclosed area away from other animals. Monitor your pet for any signs of abnormal recovery from anesthesia and/or surgery. These may include, bleeding, lethargy or weakness, loss of appetite/decreased water intake, shivering or unsteady gait that persist beyond 24 hours after surgery.

It takes 7-10 days for the surgery site to heal. During that time restrict your pet's activity by minimizing handling, and preventing your pet from running, jumping, climbing or any other activity that may keep the incision from healing.

Call the post-operative care line immediately if your pet experiences diarrhea, labored breathing or has pale gums or if your pet does not urinate or defecate.

Food and Water

It is very important for rabbits to eat following surgery in order to prevent complications with their digestive system. Offer your pet all of their regular food as soon as you get home. If your pet does not eat or drink within 12 hours of returning home, please call the postoperative line for assistance.

Pain Medication

Your pet was given long-acting pain medication in conjunction with the spay/neuter surgery. The veterinarian may prescribe additional pain medication to be given at home. **DO NOT GIVE HUMAN MEDICATION TO YOUR PET.** It is dangerous and can be fatal.

Surgery Site

There are no stitches on the outside of the surgery site. All stitches are underneath the skin. These stitches dissolve, so there is no need to seek medical attention for suture removal. The two sides of the incision are also adhered with medical grade glue.

If your animal easily allows, check the surgery site daily to make sure that it is healing. If the surgery site is very red, has green/yellow or reddish discharge, has a bad odor, has something sticking out from it, is warm to the touch, or has bruising or a bump that seems to be growing, contact the postoperative care line.

Do not apply any products to the surgery site unless recommended by staff members of the ASPCA Spay/Neuter Clinic.

Housing

Keep your pet's cage and bedding extremely clean and dry for 7-10 days following surgery. You can use a cotton towel or paper towels on top of the regular bedding to keep dust and debris from sticking to the incision. Clean urine and feces out of the cage at least twice a day and more often if needed.



Instrucciones Para el Cuidado Postoperatorio de su Conejo

Gracias por castrar a su mascota. ¡Usted ha ayudado a disminuir la población de animales! Además, su mascota va a estar mucho más saludable y feliz. Aunque las castraciones son practicas comunes en la medicina veterinaria, hay que recordar que su mascota acaba de salir de una cirugía, y va a necesitar el cuidado apropiado.

Notas: La línea de atención postoperatoria se puede contactar en (844) MY-ASPCA, (844) 692-7722. Esta línea es para cualquier pregunta que tenga después de la cirugía. Cuando marque el numero elija la opción que lo dirija a un representante que le pueda ayudar con sus preguntas. **Por favor llame a la línea de emergencias antes de buscar cualquier ayuda médica para su mascota, esta línea está abierta 24 horas 7 días a la semana.** Si su mascota tiene una enfermedad que no está relacionada con la cirugía, el ASPCA no será responsable por gastos asociados con estos tratamientos. Si no siguen las instrucciones posoperativas puede ser que el ASPCA no cubra los gastos de chequeos o tratamientos.

Anestesia y Cirugía

Después de llevar a su mascota a casa, colóquela en un área tranquila y cerrada, lejos de otros animales. Monitoree a su mascota en busca de signos de recuperación anormal de la anestesia y/o cirugía. Estos pueden incluir sangrado, letargo o debilidad, pérdida de apetito/disminución de ingestión de agua, temblores o caminar inestable que persisten más de 24 horas después de la cirugía.

Por lo general, el área de la incisión de la cirugía tarda entre 7 y 10 días en sanar. Durante este tiempo, restrinja la actividad de su mascota. Evite que su mascota corra, salte, trepe o haga cualquier otra actividad que pueda evitar que la incisión se cure.

Llame a la línea de atención postoperatoria de inmediato si su mascota tiene síntomas de diarrea, dificultad para respirar, encías pálidas o si su mascota no orina ni defeca.

Agua y Comida

Es muy importante que los conejos coman después de la cirugía para evitar complicaciones con su sistema digestivo. Ofrézcale a su mascota todos sus alimentos habituales tan pronto llegue a su casa. Si nota que su mascota no ha comido ni bebido después de 12 horas de estar en la casa, llame a la línea postoperatoria para recibir ayuda.

Medicamentos:

Su mascota recibió una inyección que alivia el dolor de la cirugía. El veterinario puede recetar más medicamentos para el dolor para que se administren en casa. **POR FAVOR NO LE DE NINGUN MEDICAMENTO HUMANO QUE ESTO PUEDE SER TOXICO Y FATAL A SU MASCOTA.**

Herida de la cirugía

No hay puntos fuera de la herida de la cirugía. Todos los puntos están debajo de la piel. Estas puntadas se disuelven, por lo que no es necesario buscar atención médica para quitar los puntos. Los dos lados de la incisión también se adhieren con pegamento de grado médico.

Si su mascota le permite, revise el sitio de cirugía diariamente para asegurar que se esté cicatrizando como debe ser. Llame a la línea posoperativa si la incisión tiene secreción de color verde/amarillo, mal olor, morados alrededor de la incisión, inflamación, algo saliendo de la incisión o se siente caliente al tocarla.

No aplique ningún producto a la herida de la cirugía a menos que lo recomienden los miembros del personal de la clínica de esterilización/castración ASPCA.

Alojamiento:

Mantenga la jaula y la ropa de cama de su mascota extremadamente limpia y seca durante 7-10 días después de la cirugía. Puede usar una toalla de algodón o toallas de papel sobre la ropa de cama para evitar que el polvo y los escombros afecten la incisión. Limpie la orina y los excrementos de la jaula al menos dos veces al día o mas según sea necesario.