

**Cortinarius rubellus**  
(نارویژي: Spiss giftslørsopp)

دا ټول مرخیري سور رنگه نصوراي وي  
(د خریري سر، کونجکه، ډنډر او تنه).  
دا ټول مرخیري په ځنگلونو کې عام دي.  
دا مرخیري په هماغه سیمو کې پیدا کیږي  
چیري چې د *Craterellus tubaeformis*  
مرخیري پیدا کیږي.



*Cortinarius rubellus*

**Cortinarius orellanus**  
(نارویژي: Butt giftslørsopp)

دا مرخیري د *Cortinarius rubellus*  
مرخیري و ته ورته دي، مگر سر یا خولی یې  
منحنی ډوله ده. دا مرخیري په ندرت سره  
پیدا کیږي او په وچو او ورسټو ځنگلونو کې  
شتون لري.



*Cortinarius orellanus*

**خطرناکه تیروتنه**

*Cortinarius rubellus* او  
*Craterellus tubaeformis* خریري  
مختلف ډوله بڼه لري، مگر په ورته ځای کې  
پیدا کیږي. که چیري د بسته بندۍ پرمهال په  
دقت او توجه سره هر خریري جلا جلا او په  
انفرادي ډول ونه ارزول شي نو د وژونکي  
*Cortinarius rubellus* کوچنی بیلگي په  
اسانۍ ورسره ورگډیدلی شي.



*Craterellus tubaeformis* او *Cortinarius rubellus*

**مسمومیت**

د وژونکي ویب کیپ او نادان ویب کیپ حتی خورا کوچنی او لږه برخه هم د پښتورگو (گردو) د جدي  
ضرر لامل کیدو لپاره کافي زهر لري. د 36 ساعتونو څخه وروسته، د مسمومیت علایم د زړه بدې،  
معدې او نس درد، د ناروغۍ عمومي احساس درلودلو او د متیازو د مقدار ډیریدو یا کمیدو سره  
راڅرگندیږي. د 3-6 ورځو په اوږدو کې د پښتورگو له کاره غورځیدو د جدي ستونزي رامینځته کیدو  
لوړ خطر شتون لري. که چیري شک مو پیدا شي چې خورلی مو دی نو د مشورې او نورو تعقیبي چارو  
لپاره د ناروي د زهرې او مسمومیت معلوماتو مرکز سره اړیکه ونیسئ.

**Amanita virosa**  
(نارویژي: Hvit fluesopp)

دا ټول مرخیري سپین رنگ لري  
(د مرخیري سر، ډنډر، کونجکه او تنه).  
په ډنډر کې یوه کرۍ لري خو هغه ورڅخه  
غورځیدلی شي. د ډنډر تر ټولو لاندینی برخه  
په یوه کاتی (کڅوره) کې ښخه وي. دا ټول  
خریري په عام توگه لرگو او لرگین ځایونو کې  
پیدا کیږي.



*Amanita virosa*

**Amanita phalloides**  
(نارویژي: Grønn fluesopp)

د سر رنگ یې شین، نصوراي یا طلايي وي.  
کنجکه او ډنډر یې سپین وي. په ډنډر کې یوه  
کرۍ لري خو هغه ورڅخه غورځیدلی شي.  
د ډنډر تر ټولو لاندینی برخه په یوه کاتی  
(کڅوره) کې ښخه وي. دا ټول خریري په  
ندرت سره پیدا کیږي.



*Amanita phalloides*

**Galerina marginata**  
(نارویژي: Flatklokkehatt)

سر او کنجکه یې نصوراي طلايي رنگ لري.  
ډنډر یې نصوراي یا خر وي. دا یو ډول  
کوچنی خریري دی چې عموماً د ونو ډډ او  
سټو یا ریښو څنگته وده کوي. دا ټول خریري  
ډیر عام دي.



*Galerina marginata*

**مسمومیت**

د دې درې ډوله خریريو حتی خورا کوچنی برخه هم د جدي مسمومیت (زهرې) لامل کیدی شي. د  
خورلو څخه لږترلږه 6 ساعتونه وروسته انسان ته خورا شدیدې اوجنه نس ناستی یا اسهال، د معدې او  
نس درد او استفراغ پیدا کوي. د 2-3 ورځو په لړ کې یې د ځیگر د ژوند گواښونکي لوړ زیان یا خطر  
سره مخ کوي. که چیري شک مو پیدا شي چې خورلی مو دی نو د مشورې او نورو تعقیبي چارو لپاره د  
ناروي د زهرې او مسمومیت معلوماتو مرکز سره اړیکه ونیسئ.





## په ناروي کې زهري مرخيري



د خوړلو وړ مرخيري، نه خوړل کېدونکي مرخيري او زهري مرخيري ټول په ځنگلونو کې پيدا کېږي او وده کوي. د ناروي ځيني ډيری زهري مرخيري په نورو هيوادونو کې سهواً يا د تيروتنې له مخې د خوړلو وړ ورته مرخيري گڼل کېدی شي. که چيرې د مسموميت شک پيدا شي نو د ناروي د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز سره اړيکه ونيسئ.

### د مرخيرو د راټولو په اړه غوره مشوره:

- يوازې هغه مرخيري وخورئ چې تاسې ورڅخه 100% ډاډه ياست،
- هيڅکله نا آشنا مرخيري مه څکي يا مه تجربه کوئ! حتی زهري مرخيري هم شايد بڼه خوند ولري.
- د مرخيرو په اړه تازه او ورځني معلومات وکاروئ،
- هرډول چينجن شوي يا خوسا او خراب شوي مرخيري ليرې وغورځوئ.

### د ناروي د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز

تليفون: 22 59 13 00 (24 – ساعتونه)

[www.giftinfo.no](http://www.giftinfo.no)

دا بروشور د ناروي د زهري او مسموميت معلوماتو مرکز لخوا توليد شوی دی ([www.giftinfo.no](http://www.giftinfo.no)). د ويب پاڼې څخه په نارويجي ژبه تفصيلي بروشور داوڼلود کولی شئ. د ناروي ميکولوژيکي ټولنه ([www.soppognyttevekster.no](http://www.soppognyttevekster.no)) د مرخيرو کورسونه او د مرخيرو تفتيش په لاره اچوي.



*Amanita muscaria var. muscaria / var. regalis / pantherina*

(نارويژي: **Rød/brun- og panterfluesopp**)

دا ډول مرخيري سپين کونجکي لري او ډنډر يې يوه کرۍ لري. د ډنډر پښه يې پرسېدلې وي. خولۍ يا سر يې سور يا خر ډوله رنگ لري او سپين ټاكي پکې وي.

### مسموميت

دا خريري په عصبي سيستم اغيزه کونکي زهر لري. علايم يې د خوړل کيدو څخه 1/2-3 ساعتونه وروسته راڅرگنديږي. د کوچني مقدار خوړل يې د گيچ کيدو، گنگس کيدو، د عضلاتو د درد او د معدې او نس د ستونزو لامل کېږي. د دې له امله جدي مسموميت په ندرت سره رامینځته کېږي، مگر د ډير مقدار خوړل يې د داسې ناروغيو او علايمو لامل کېږي چې د روغتون درملني ته اړتيا لري.



*Paxillus involutus*

(نارويژي: **Pluggsopp**)

دا ډول مرخيري خر سر لري چې دننه لور ته تاو شوي څنډه هم لري، او ډنډري او کونجکي يې هم خړې وي او کله چې ورباندې فشار راوړل شي نو رنگ يې تياره کېږي. Paxillus involutus ډير عام دي.

### مسموميت

*Paxillus involutus* ډيری مختلف ډوله زهر لري او د بيلابيل توپيري علايمو لامل کېدی شي. د دا ډول خام مرخيرو خوړلو څخه 1/2-3 ساعتونه وروسته استفراغ، اسهال او د نس درد رامینځته کېدی شي. د پاخه شوي يا گرم دا مرخيري په مکرر ډول خوړلو وروسته، جدي مسموميت رامینځته کېږي چې پايله يې د ويني حجرو او پښتورگو زيانمن کيدو په صورت کې راوځي.



*Leccinum versipelle*

(نارويژي: **Rødskrub**)

دا مرخيري سور نسواري رنگه سر يا خولۍ او په سپين ډنډر تور ټکي لري. کله چې پرې شي نو بدن يې تياره کېږي. دا ډول مرخيري په ټول هيواد کې عام دي.

### مسموميت

*Leccinum versipelle* د خوړلو وړ فنجي دی که چيرې لږترلږه د 15 دقيقو لپاره پوخ شي. که چيرې په کافي اندازه پوخ او گرم نشي، نو دا به شايد هغه مرخيري وي چې په ناروي کې د نس ډيری پيښو لامل کېږي. زړه بدی، استفراغ، اسهال او د نس درد هغه ناروغي دي چې د دې مرخيري د خوړلو څخه يو څو ساعتونه وروسته پيښيږي. علايم يې عموماً تر 1-2 ساعتونو پورې دوام کوي. که چيرې ډير مقدار يې وخورل شي، د نس درد ډير کېدی شي او په روغتون کې بستري کيدو ته اړتيا پيدا کېږي.

عکس: پر مرستاد