

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

**(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2014)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) Coloque F (Falso) ou V (Verdadeiro) nas afirmativas abaixo, considerando os efeitos colaterais dos antipsicóticos, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- () A síndrome neuroléptica maligna requer tratamento ambulatorial e é comum no tratamento com o clonazepam.
() O paciente com acatisia não consegue permanecer imóvel, anda a esmo e sente inquietação interna.
() A agranulocitose é uma situação de emergência associada ao uso da clozapina.
() As drogas antipsicóticas causam dependência química.
- (A) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (V) (F) (V)
(C) (V) (F) (V) (F)
(D) (F) (V) (V) (F)
(E) (V) (F) (F) (V)
- 2) A obstrução da via aérea por corpo estranho pode ser parcial ou completa. Qual manobra é recomendada para aliviar a obstrução de via aérea por corpo estranho no adulto?
- (A) Valsalva.
(B) Leopold.
(C) Hirschberg.
(D) Cheyne-Stokes.
(E) Heimlich.
- 3) Assinale a opção que apresenta apenas instrumentos denominados materiais de diérese.
- (A) Bisturis e trépano.
(B) Agulhas de sutura e porta-agulhas.
(C) Afastadores e pinças hemostáticas.
(D) Agulhas de sutura e fios cirúrgicos.
(E) Bisturis e pinças hemostáticas.

- 4) A insulina é um hormônio hipoglicemiantre e que controla o armazenamento e o metabolismo dos hidratos de carbono - as proteínas e gorduras. Segundo Lima e Matão (2010), que tipo de insulina tem ação ultralenta (6 a 8 horas) e duração de 24 a 30 horas?
- (A) Protamina Zinco.
(B) Simples.
(C) Regular.
(D) Cristalina.
(E) Langerhans.
- 5) Segundo Matão e Lima (2010), as anemias podem ser classificadas, quanto à etiologia, em:
- (A) perniciosa, quando há deficiência de vitamina B12.
(B) falciforme, quando há hemoglobina em forma de bastão.
(C) aplástica, quando há aumento das células precursoras na medula óssea.
(D) ferropriva, quando há deficiência do ácido fólico.
(E) hemofílica, quando há perda de grande volume de sangue.
- 6) Que vacina é contraindicada para indivíduos que tenham apresentado ocorrência anterior de reação anafilática à proteína de ovo?
- (A) BCG.
(B) Influenza.
(C) Hepatite B.
(D) dT.
(E) Rotavírus.
- 7) Que doença infecciosa viral aguda apresenta, no período prodromico, pequenas manchas brancas com halo eritematoso, na altura dos pré-molares, conhecido como sinal de Koplik?
- (A) Sarampo.
(B) Rubéola.
(C) Escarlatina.
(D) Dengue.
(E) Sífilis.

- 8) Segundo Lima e Matão (2010), que doença sexualmente transmissível tem como complicações o aborto espontâneo, o natimorto, o parto prematuro e a gravidez ectópica?
- (A) Condiloma acuminado.
(B) Gonorreia.
(C) Tricomoníase vaginal.
(D) Cancro mole.
(E) Herpes genital.
- 9) Em todo recém-nascido cujo parto tenha acontecido por via vaginal, deve-se proceder a profilaxia ocular que consiste na aplicação de:
- (A) vitamina K.
(B) água boricada.
(C) nitrato de prata 1%.
(D) vitamina A.
(E) sulfadiazina de prata 0,5%.
- 10) Qual suplemento deverá ser prescrito na gravidez para prevenção de malformação no tubo neural?
- (A) Sulfato ferroso.
(B) Ácido fólico.
(C) Vitamina k.
(D) Vitamina E.
(E) Ferritina.
- 11) Para o cálculo de gotejamento de soluções, considera-se que 1 (uma) gota equivale a:
- (A) 0,1 microgota.
(B) 0,3 microgota.
(C) 3 microgotas.
(D) 10 microgotas.
(E) 30 microgotas.

- 12) Com relação ao aleitamento materno, pode-se afirmar que o mesmo é permitido se a
- (A) mãe for portadora do HIV.
 - (B) mãe estiver com dengue.
 - (C) mãe estiver infectada pelo HTLV1 e HTLV2.
 - (D) criança for portadora de galactosemia.
 - (E) mãe estiver na fase aguda da doença de Chagas.
- 13) Segundo Lima e Matão (2010), qual das desnutrições abaixo se caracteriza pela carência proteica, sendo mantido relativo aporte calórico, em que a criança apresenta como sinais edema clínico, face de lua cheia e presença de dermatoses?
- (A) Pelagra.
 - (B) Marasmo.
 - (C) Beribéri.
 - (D) Raquitismo.
 - (E) Kwashiorkor.
- 14) Segundo Cintra (2008), que droga é utilizada na ressucitação cardiorrespiratória na condição de fibrilação ventricular resistente à terapia elétrica?
- (A) Adenosina.
 - (B) Atropina.
 - (C) Lidocaína.
 - (D) Gluconato de cálcio.
 - (E) Bicarbonato de sódio.
- 15) De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação com BCG é indicada nas seguintes situações, EXCETO:
- (A) em criança que foi vacinada há mais de 6 meses e não houver cicatriz vacinal.
 - (B) em indivíduos que sejam HIV positivo sintomáticos.
 - (C) em indivíduos que sejam casos comunicantes de Hanseníase.
 - (D) em profissionais de saúde expostos à Tuberculose que sejam não reatores ou reatores fracos ao teste tuberculínico (PPD).
 - (E) em filhos de mães HIV positivas, o mais precoce possível.

- 16) Com relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que esses profissionais
- (A) podem participar de ato abortivo, nos casos previstos em lei.
 - (B) devem manter sigilo profissional, exceto quando o fato for de conhecimento público.
 - (C) não podem prestar serviços que competem a outro profissional, mesmo em casos de emergência.
 - (D) não podem ser omissos com qualquer forma de violência, exceto quando tal fato expõe sua carreira.
 - (E) podem participar da prática de eutanásia.
- 17) O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem (art. 27) proíbe a equipe de enfermagem de "executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte." Sendo assim, é correto afirmar que o profissional que infringir esse artigo estará sujeito à aplicação da seguinte penalidade:
- (A) pagamento de multa.
 - (B) suspensão do exercício profissional.
 - (C) cassação do direito do exercício profissional.
 - (D) censura restrita ao âmbito interno do hospital.
 - (E) advertência verbal.
- 18) Segundo Lima e Matão (2010), que posição é utilizada para exames vaginais e retais e também como exercício após o parto para fazer o útero retornar à posição normal?
- (A) Sims.
 - (B) Genupeitoral.
 - (C) Ginecológica.
 - (D) Litotômica.
 - (E) Ventral.
- 19) Segundo Kawamoto (2012), espasmos, contrações involuntárias e súbitas dos músculos esqueléticos são sinais de:
- (A) estupor.
 - (B) obnubilação.
 - (C) coma.
 - (D) trismo.
 - (E) convulsão.

- 20) Segundo Souza e Horta (2012), um idoso com o seguinte quadro clínico: esquecimento, dificuldade nos relatos mais recentes, desorientação temporal, dificuldade em nomear objetos, empobrecimento da fala, repetição, perda de objetos, mudanças de comportamento e inversão do ciclo sono-vigília, apresenta um quadro de demência do tipo:
- (A) Alzheimer.
(B) Frontotemporal.
(C) Parkinson.
(D) Vascular.
(E) Corpos de Lewy.
- 21) Trauma Raquimedular (TRM) é qualquer trauma direto ou indireto sobre a coluna vertebral, podendo ou não ocorrer lesões irreversíveis. Segundo Cintra (2008), qual é a principal causa de morte durante a fase aguda do TRM?
- (A) Insuficiência respiratória.
(B) Hipertensão intracraniana.
(C) Insuficiência renal.
(D) Sepse.
(E) Choque cardiogênico.
- 22) Os exames de laboratório são muito importantes para definição do diagnóstico, avaliação do estado do paciente e tomada de decisão na conduta terapêutica. Segundo Kawamoto (2012), quanto à coleta de escarro, pode-se afirmar que:
- (A) é indicada apenas para diagnosticar tuberculose.
(B) é realizada somente por meio de aspiração traqueal estéril.
(C) deve-se orientar o paciente a inspirar superficialmente antes de tossir.
(D) caso a amostra contenha apenas saliva, deve-se repetir o processo.
(E) deve ser feita pela manhã, antes do desjejum, após higiene oral.

- 23) Qual é a via de administração das vacinas contra sarampo e febre amarela?
- (A) Intramuscular.
(B) Subcutânea.
(C) Intradérmica.
(D) Oral.
(E) Intraespinhal.
- 24) A hanseníase é uma doença considerada endêmica no território nacional. Assinale a opção correta com relação a essa patologia.
- (A) O microorganismo causador da doença é o mycobacterium hansen.
(B) É uma doença infectocontagiosa de evolução rápida e aguda.
(C) O microorganismo causador da doença tem afinidade com células cutâneas e dos nervos periféricos.
(D) Os doentes multibacilares não transmitem a patologia.
(E) É uma doença com baixa infectividade e alta patogenicidade.
- 25) Segundo Lima e Matão (2010), a glomerulonefrite difusa aguda responde pela maioria das admissões por doença renal na enfermaria pediátrica e tem como causa mais comum:
- (A) reação imunitária às infecções de pele e de vias aéreas superiores que, geralmente, são causadas por certo tipo de estreptococos.
(B) infecção do aparelho urinário por fungos tipo Candida albicans, caracterizada por placas esbranquiçadas.
(C) afecções parasitárias por Sarcoptes scabiei de contágio direto ou indireto com indivíduos afetados.
(D) má alimentação associada aos cálculos ureterais que levam à fisiopatologia da doença.
(E) doenças metabólicas como Diabetes mellitus.

26) Segundo Lima e Matão (2010), assinale a opção que corresponde ao cuidado prestado pelo técnico em enfermagem no pós-operatório imediato.

- (A) Realizar banho de aspersão, a fim de reduzir a flora bacteriana cutânea.
- (B) Observar e anotar a aceitação da dieta, oferecendo líquidos por via oral de 2 em 2 horas.
- (C) Verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas até que se restabeleçam os padrões normais.
- (D) Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e pescoço estendido, para prevenir a aspiração, nos casos de vômitos.
- (E) Melhorar a capacidade respiratória, através de exercícios respiratórios, de nebulização, de drenagem postural e de tapotagem.

27) De acordo com protocolo do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, é correto afirmar que a gestante é considerada imunizada, em relação ao tétano, ao receber:

- (A) duas doses da vacina antitetânica, sendo a segunda administrada após o parto.
- (B) três doses da vacina antitetânica, com intervalo mínimo de 10 dias e máximo de 20 dias.
- (C) uma dose da vacina antitetânica quando não há registro de vacinação prévia.
- (D) três doses da vacina antitetânica, com intervalo de 60 dias ou mínimo de 30 dias.
- (E) uma dose da vacina antitetânica, administrada 10 dias antes do parto.

- 28) Segundo Kawamoto (2012), com relação à temperatura corporal, pode-se afirmar que:
- (A) a aferição da temperatura oral é indicada para crianças, idosos e doentes graves.
 - (B) a temperatura retal é considerada a menos fidedigna, sendo contraindicada aos pacientes submetidos às intervenções cirúrgicas do reto.
 - (C) a via axilar é a mais frequente, por ser a de melhor precisão em relação às demais.
 - (D) é desaconselhável o uso de termômetro com mercúrio, em razão da toxicidade deste elemento químico, pelo risco ocupacional e ambiental.
 - (E) os indivíduos desnutridos apresentam temperatura corporal elevada pela deficiência no metabolismo celular.
- 29) Assinale a opção que, segundo Stuart e Laraia (2001), corresponde a uma droga antipsicótica que pode ser administrada por via intramuscular.
- (A) Fenitoína.
 - (B) Diazepam.
 - (C) Fenobarbital.
 - (D) Bupropiona.
 - (E) Flufenazina.
- 30) Que tipo de curativo é indicado para estancar hemorragia?
- (A) Compressivo.
 - (B) Aberto.
 - (C) Fechado.
 - (D) Oclusivo.
 - (E) Interativo.

- 31) Segundo Lima e Matão (2010), uma criança com sinal de prega acentuado, choro sem lágrimas e pulso radial débil, apresenta um quadro de desidratação:
- (A) leve (1º grau).
(B) gravíssima (4º grau).
(C) moderada (2º grau).
(D) grave (3º grau).
(E) simples (1º grau).
- 32) O edema agudo de pulmão (EAP) é a manifestação mais dramática e de emergência da hipertensão venosa pulmonar. Segundo Cintra (2008), assinale a opção que corresponde a um cuidado de enfermagem com o paciente com o quadro de EAP.
- (A) Administrar cloridrato de naloxona, conforme prescrição médica, pois é um agente inotrópico.
(B) Fazer nebulização somente com ar comprimido.
(C) Realizar garroteamento de membros superiores e membros inferiores, mantendo sempre uma das extremidades livres, com rodízio no sentido anti-horário, a cada 20 minutos.
(D) Colocar o paciente em posição sentada com os membros inferiores pendentes.
(E) Encaminhar o paciente para realização de tomografia de tórax com urgência.
- 33) Qual é a via de administração do soro antiofídico?
- (A) Intradérmica.
(B) Subcutânea.
(C) Intramuscular.
(D) Intramuscular profunda.
(E) Endovenosa.

- 34) O deslocamento prematuro de placenta (DPP) é a separação precoce da placenta antes da expulsão do feto e é considerado um dos acidentes mais sérios em obstetrícia. Os sintomas do DPP são:
- (A) dor abdominal súbita, útero de consistência mole e eliminação de vesículas claras via vaginal.
(B) vômito persistente, perda de peso e ausência de batimento cardio-fetal.
(C) pressão diastólica superior a 110mmHg, proteinúria e cefaleia.
(D) dor abdominal, edema e convulsões.
(E) dor abdominal súbita, sinais de choque e batimento cardio-fetal evidenciando sofrimento.
- 35) O volume máximo indicado na administração de medicamentos por via subcutânea é de:
- (A) 0,5ml
(B) 1,0ml
(C) 1,5ml
(D) 2,0ml
(E) 3,0ml
- 36) A ingestão de carne crua e mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e carneiro não é recomendada na gravidez a fim de evitar infecção pelo:
- (A) Clostridium tetani.
(B) Toxoplasma gondii.
(C) Haemophilus influenza.
(D) Epstein-Barr.
(E) Bacilo de koch.

- 37) Segundo Cintra (2008), dentre os padrões básicos de alterações do ritmo cardíaco na parada cardiorespiratória, qual se caracteriza por estímulos elétricos regulares no ECG, com ausência da resposta mecânica do miocárdio, não sendo possível a detecção do pulso?
- (A) Taquicardia ventricular sem pulso.
(B) Fibrilação ventricular sem pulso.
(C) Assistolia.
(D) Atividade elétrica sem pulso.
(E) Bloqueio atrioventricular de 3º grau.
- 38) Na terminologia cirúrgica, o sufixo indica a intervenção cirúrgica a ser realizada. Dessa forma, o sufixo "ectomia" significa:
- (A) incisão, corte.
(B) comunicar um órgão com o exterior.
(C) extirpar parcial ou totalmente um órgão.
(D) reparação plástica da forma ou função.
(E) fixação de uma estrutura corpórea.
- 39) Segundo Cintra (2008), que droga é indicada para intoxicações por inseticidas, organofosforados e carbamatos, por doses excessivas de fisostigmina ou por cogumelos que apresentam nítida ação muscarínica?
- (A) Atropina.
(B) Acetilcisteína.
(C) Azul de metíleno.
(D) Biperideno.
(E) EDTA-cálcico.
- 40) A técnica de coleta de urina depende do tipo de exame solicitado. Segundo Kawamoto (2012), qual dos exames abaixo não requer cuidados específicos, devendo-se apenas coletar a amostra, identificar o frasco e encaminhá-lo ao laboratório com pedido de exame?
- (A) Cultura.
(B) Urina de 24horas.
(C) Teste de gravidez.
(D) Proteinúria.
(E) Tipo I, sedimento quantitativo.

- 41) Segundo Horta e Souza (2012), para garantir a qualidade dos resultados dos exames preventivos do câncer do colo uterino, é recomendado:
- (A) utilizar duchas ou medicamentos vaginais 48 horas antes da coleta.
(B) evitar relações sexuais duas horas antes da coleta.
(C) realizar o exame fora do período menstrual.
(D) suspender o uso do anticoncepcional oral 24 horas antes da coleta.
(E) utilizar espermicidas para facilitar introdução do espéculo.
- 42) Segundo Lima e Matão (2010), a colocação de um dreno tubular no espaço intrapleural para remoção de gás, líquidos e/ou sólidos consiste na drenagem torácica. Com relação aos cuidados que esse tratamento requer, é correto afirmar que:
- (A) deve-se manter o leito a 0° para facilitar a drenagem e a expansão pulmonar.
(B) o paciente deve ser encorajado a respirar superficialmente para evitar deslocamento do dreno.
(C) o frasco deve ser mantido no mesmo nível do tórax para evitar o refluxo das drenagens.
(D) deve-se evitar clamppear o dreno durante o transporte do paciente ou a deambulação, pois um dreno clampeado pode provocar pneumotórax hipertensivo.
(E) deve-se ordenhar sempre o dreno, pois esse procedimento é considerado eficaz para a aceleração da drenagem de líquidos do espaço intrapleural.
- 43) Qual é a infecção bacteriana aguda que circunda o anel umbilical e se caracteriza por apresentar sinais de hiperemia do tecido periumbilical, com ou sem secreção purulenta?
- (A) Orquite.
(B) Criptorquidíia.
(C) Tétano.
(D) Onfalite.
(E) Enterocolite.

- 44) Segundo Kawamoto (2012), a infusão de fluidos no tecido subcutâneo para correção de desequilíbrio hidreletrolítico, recomendada especialmente para pacientes idosos ou sob cuidados paliativos, é denominada:
- (A) paracentese.
(B) infusão intramuscular.
(C) hipodermóclise.
(D) infusão intratecal.
(E) infusão intradérmica.
- 45) Segundo Kawamoto (2012), a ANVISA relaciona como medida de precaução padrão:
- (A) higienização das mãos com substâncias degermantes apenas antes do contato com o paciente.
(B) utilizar recipiente específico para descarte de material perfurocortante, atentando para sempre desconectar as agulhas antes do descarte da seringa.
(C) o uso de máscara, óculos e protetor facial apenas para procedimentos realizados em centro cirúrgico.
(D) uso de avental quando houver possibilidade de contato da pele ou roupas do profissional de saúde com sangue ou líquidos corporais.
(E) vacinação do profissional como medida profilática contra febre amarela, sendo essa recomendação incluída na NR-32.
- 46) Considere que um paciente foi admitido na emergência de um hospital apresentando queimadura em toda a extensão dos membros superiores. Segundo a regra dos nove, para o paciente queimado, qual é a superfície corporal queimada?
- (A) 4,5
(B) 9
(C) 18
(D) 27
(E) 36

- 47) De acordo com a regra de Naegele, qual será a data provável do parto de uma gestante cuja data da última menstruação foi 13/09/2013?
- (A) 20/05/2014
(B) 20/06/2014
(C) 21/06/2014
(D) 20/07/2014
(E) 21/07/2014
- 48) Segundo Nettina (2003), qual é a complicação mais comum associada à diálise peritoneal?
- (A) Choque.
(B) Peritonite.
(C) Sangramento.
(D) Hipoglicemias.
(E) Hipertensão.
- 49) O índice APGAR é utilizado para verificar a vitalidade do recém-nascido no 1º e 5º minutos de vida. Assinale a opção que NÃO corresponde a um sinal avaliado no APGAR.
- (A) Temperatura corporal.
(B) Frequência cardíaca.
(C) Respiração.
(D) Tônus muscular.
(E) Coloração.
- 50) Segundo Potter (2013), para qual doença devem-se utilizar medidas de precaução por gotícula?
- (A) Coqueluche.
(B) Tuberculose pulmonar.
(C) Varicela-Zóster.
(D) Sarampo.
(E) Vírus Sincicial respiratório.