

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO
DE MÉDICOS DO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA / CP-
CSM-MD/2024)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

QUADRO DE MÉDICOS

QUESTÃO 1

De acordo com Montenegro (2017), em ordem cronológica, quais são os processos da fisiologia da lactação?

- (A) Mamogênese, Lactopoeze, Lactogênese.
- (B) Lactopoeze, Mamogênese, Lactogênese.
- (C) Mamogênese, Lactogênese, Lactopoeze.
- (D) Lactogênese, Lactopoeze e Mamogênese.
- (E) Embriogênese, Mamogênese e Lactogênese.

QUESTÃO 2

A rápida disseminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) para diversos países levou a Organização Mundial de Saúde a classificá-la em março de 2020 como pandemia. Assinale a opção que apresenta corretamente os critérios para o diagnóstico de COVID-19 em crianças.

- (A) Infecção assintomática: ausência de sinais ou sintomas de doença com radiografia ou tomografia de tórax normais com resultado do teste de ácido nucleico para 2019-nCoV negativo.
- (B) Doença leve: sintomas de infecção aguda do trato respiratório inferior, incluindo espirros, e em todos os casos há febre.
- (C) Doença moderada: sinais clínicos de pneumonia. Febre persistente, tosse seca inicial e depois produtiva. Alguns pacientes poderão não apresentar sinais clínicos ou sintomas, mas a tomografia computadorizada de tórax poderá revelar lesões pulmonares típicas.
- (D) Doença grave: os sintomas respiratórios iniciais como febre e tosse podem não estar associados com sintomas gastrointestinais como diarreia. O agravamento clínico geralmente ocorre após 24 horas do surgimento de dispneia e cianose central. A SpO₂ é < 95% e há outras manifestações de hipoxemia.
- (E) Crítica: as crianças podem progredir lentamente para a síndrome do estresse respiratório agudo ou insuficiência respiratória e poderão apresentar choque e encefalopatia. A disfunção de múltiplos órgãos não é fatal como nos adultos.

QUESTÃO 3

A cirurgia de Bypass gástrico em Y de Roux para tratamento da obesidade mórbida pode apresentar complicações. Assim, qual é a complicação metabólica de longo prazo mais comum após essa cirurgia?

- (A) Deficiência de Vitamina B6 e Vitamina B9.
- (B) Deficiência de ferro e Vitamina B12.
- (C) Deficiência de ferro e Vitamina D.
- (D) Deficiência de Cálcio e Vitamina D.
- (E) Deficiência de Vitamina B12 e Cálcio.

QUESTÃO 4

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação a algumas formas de violência na escola e assinale a opção correta.

- () *Bullying* é definido como atitudes agressivas adotadas por um ou mais estudantes, contra outro ou outros, causando dor e angústia.
- () O *bullying* se caracteriza se houver uma motivação (vingança, disputa ou para auferir vantagem de qualquer natureza).
- () *Cyberbullying* é o termo utilizado para denominar a violência praticada com o uso da tecnologia de informática e internet, por meio de postagens, imagens ou vídeos.
- () O *Cyberbullying* é uma modalidade que tem o potencial de causar danos psicológicos menos acentuados.
- () Repetição: convencionou-se contar *bullying* a partir da 1ª vez quando há existência de plateia.

- (A) (F) (V) (F) (F) (V)
- (B) (V) (F) (V) (F) (F)
- (C) (V) (F) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (V) (F) (V)
- (E) (V) (F) (F) (V) (F)

QUESTÃO 5

Assinale a opção que apresenta corretamente uma das funções do levantador do ânus.

- (A) Sustenta a parede posterior da vagina.
- (B) Sustenta o cóccix e o puxa anteriormente.
- (C) Flexiona a coxa e estabiliza o tronco sobre a coxa.
- (D) Estabiliza o tendão central do períneo.
- (E) Comprime a uretra.

QUESTÃO 6

De acordo com Jameson et al. (2020), qual é a patologia que melhor se enquadra num quadro de início insidioso, caracterizada por diarreia, esteatorreia, dor abdominal, perda de peso, artropatia migratória das grandes articulações, febre, sintomas oftalmológicos, que pode progredir com demência e cuja biópsia tecidual do intestino delgado pode evidenciar aumento dos macrófagos PAS-positivos?

- (A) Espru Tropical.
- (B) Doença de Ménétrier.
- (C) Doença de Bartter.
- (D) Doença de Whipple.
- (E) Retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 7

De acordo com Almeida Filho (2021), são princípios da ética em pesquisa que envolve seres humanos:

- (A) autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
- (B) isonomia, eficiência, justiça e não maleficência.
- (C) eficácia, autonomia, justiça e ética.
- (D) ética, eficiência, autonomia e justiça.
- (E) autonomia, não maleficência, beneficência e ética.

QUESTÃO 8

De acordo com Campbell (2017), o diagnóstico será artrite reumatoide quando se encontra em métodos de imagem:

- (A) erosão periarticular.
- (B) osteofitose marginal.
- (C) fratura subcondral.
- (D) cisto subcondral.
- (E) lesão osteocondral.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta que apresenta corretamente a causa mais frequente de hiponatremia euvolêmica.

- (A) Vômitos e diarreia.
- (B) Diuréticos em excesso.
- (C) Síndrome nefrótica.
- (D) Cirrose hepática.
- (E) Síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético.

QUESTÃO 10

Os pontos de corte da frequência respiratória em crianças com taquipneia, de acordo com a faixa etária, são:

- (A) < 2 meses: FR maior ou igual 50 irpm.
- (B) < 2 meses: FR maior ou igual 40 irpm.
- (C) 2 a 11 meses: FR maior ou igual 60 irpm.
- (D) 1 a 4 anos: FR maior ou igual 50 irpm.
- (E) 1 a 4 anos: FR maior ou igual 40 irpm.

QUESTÃO 11

O estado nutricional das crianças brasileiras atualmente está em processo de transição. O Ministério da Saúde mostra que o problema de obesidade já afeta 1/5 da população infantil. Diante do exposto, assinale a opção correta.

- (A) A introdução alimentar aos seis meses de vida deve respeitar a necessidade de equilibrar essa transição do aporte calórico para evitar excessos ou deficiências.
- (B) A obesidade para a criança não se apresenta como um fator desencadeante para comorbidades futuras.
- (C) A influência da nutrição, do estresse tóxico e do estilo de vida não tem peso suficientes para influenciar a expressão gênica.
- (D) O estilo de vida dos pais com hábitos alimentares inadequados e sedentários não influencia diretamente no desenvolvimento da epigenética de seus filhos.
- (E) O reconhecimento e a condução da programação metabólica não devem ocorrer desde o começo da vida.

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta sobre líquidos pleurais com características de exsudato.

- (A) Possui a relação LDH do líquido Pleural/ LDH do soro menor que 0,6.
- (B) Possui a relação da proteína no líquido pleural / soro maior que 0,5.
- (C) Possui valor do LDH no líquido pleural menor que 2/3 do limite superior do valor normal no soro.
- (D) Sua principal causa é a insuficiência cardíaca congestiva.
- (E) Ocorre na cirrose hepática inicial, sem fatores de complicação.

QUESTÃO 13

A tendência que o oxigênio tem de deixar a corrente sanguínea quando a concentração de dióxido de carbono aumenta e de facilitar a liberação de oxigênio da hemoglobina para os tecidos e aumentar a concentração de oxigênio na hematose chama-se:

- (A) efeito haldane.
- (B) reflexo hering-breuer.
- (C) reflexos dos impulsos respiratórios.
- (D) reflexo à dor.
- (E) efeito bohr.

QUESTÃO 14

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é o acidente mais prevalente nas crianças menores de 5 anos, em especial nas menores de 1 ano. O aumento da pressão intracraniana após lesão cerebral pós-traumática vai acarretar a necessidade de ajustes fisiológicos do sistema nervoso central a fim de manter a pressão intracraniana e evitar herniação do tecido cerebral. Nesse contexto, NÃO haverá:

- (A) diminuição da produção de líquido.
- (B) aumento da reabsorção de líquido.
- (C) aumento do retorno venoso.
- (D) tríade de cushing (bradicardia, alteração respiratória e hipotensão arterial sistêmica).
- (E) ajuste do fluxo sanguíneo cerebral de acordo com as demandas metabólicas.

QUESTÃO 15

De acordo com Jameson et al. (2020), os dois principais componentes do transporte de oxigênio (DO₂) são:

- (A) oxigênio e plasma.
- (B) frequência cardíaca e frequência respiratória.
- (C) débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio.
- (D) resistência vascular sistêmica e frequência cardíaca.
- (E) conteúdo arterial de oxigênio e saturação de oxigênio.

QUESTÃO 16

Uma mulher de 28 anos procura ambulatório de ginecologia desejando engravidar. Refere menarca aos 14 anos com hipermenorreia e dismenorreia com piora progressiva, relata também dispareunia e nega uso de contraceptivos hormonais. Com base nessas informações, qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Leiomiomatose uterina.
- (B) Síndrome dos ovários policísticos.
- (C) Endometriose.
- (D) Pólipo endometrial.
- (E) Doença inflamatória pélvica.

QUESTÃO 17

Sobre os distúrbios do movimento hipercinético, o termo que define os movimentos involuntários não padronizados, rápidos, semipropositais, graciosos e semelhantes a uma dança, que acometem grupos musculares proximais ou distais, é denominado:

- (A) tremor.
- (B) tique.
- (C) atetose.
- (D) coreia.
- (E) mioclonia.

QUESTÃO 18

A involução e a regeneração do leito placentário se dão pela eliminação de grande quantidade de elementos deciduais e células epiteliais que associados a eritrócitos e bactérias compõem o lóquios. Assim, como se chama o lóquios com quantidade significativa de leucócitos e coloração esbranquiçada?

- (A) *Lochia rubra*.
- (B) *Lochia fusca*.
- (C) *Lochia alba*.
- (D) *Lochia flava*.
- (E) *Lochia echio*.

QUESTÃO 19

Dentre os tipos de neoplasia de tireoide, qual é a forma mais comum?

- (A) Carcinoma medular.
- (B) Carcinoma de Células de Hurthle.
- (C) Carcinoma folicular.
- (D) Carcinoma anaplásico.
- (E) Carcinoma papilífero.

QUESTÃO 20

Analise as afirmativas abaixo sobre a via biliar.

- I- A colangite esclerosante primária é um processo idiopático, provavelmente autoimune, que afeta a árvore biliar intra e extra-hepática.
- II- A apresentação clássica da colangite é a tríade de Charcot, com febre, icterícia e dor em quadrante superior direito.
- III- Pólipos da vesícula biliar tem sempre indicação de colecistectomia.
- IV- Íleo biliar é uma fístula entre a vesícula biliar e o duodeno, causada por uma inflamação subjacente.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

QUESTÃO 21

De acordo com Sabiston (2015), NÃO é um benefício da traqueostomia em pacientes com uso de ventilação mecânica prolongada:

- (A) reduzir o risco de dano à laringe.
- (B) auxiliar na ventilação.
- (C) melhorar o conforto do paciente.
- (D) auxiliar na higiene pulmonar.
- (E) diminuir a chance de pneumotórax espontâneo.

QUESTÃO 22

De acordo com Jameson et al. (2020), o principal marcador de hipoperfusão tecidual é:

- (A) lactato arterial.
- (B) saturação de O₂.
- (C) Pao₂.
- (D) hemoglobina sérica.
- (E) saturação venosa central de oxigênio.

QUESTÃO 23

De acordo com Cangioni (2021), entende-se por Espaço Morto Alveolar:

- (A) o volume de todos os espaços do sistema respiratório com exceção dos alvéolos e as áreas relacionadas a eles.
- (B) aqueles alvéolos não funcionando (alvéolos ventilados, mas pouco ou não perfundidos).
- (C) o local responsável pelo controle do padrão respiratório.
- (D) o local onde ocorre a bifurcação das artérias pulmonares.
- (E) o local onde o sangue desoxigenado, oriundo do coração direito, retorna ao lado esquerdo, sem ser oxigenado pelo pulmão.

QUESTÃO 24

De acordo com Campbell (2017), a doença de Legg-Calvé-Perthes acomete:

- (A) a tuberosidade anterior da tíbia.
- (B) a cabeça do úmero.
- (C) o platô tibial medial.
- (D) a cabeça do fêmur.
- (E) o dômus talar.

QUESTÃO 25

De acordo com Sabiston (2015), o Triângulo de Hasselbach é definido por:

- (A) vasos epigástricos superiores, bainha do reto e ligamento inguinal.
- (B) vasos epigástricos inferiores, bainha do reto e ligamento inguinal.
- (C) ligamento de Cooper, bainha do reto e ligamento inguinal.
- (D) ligamento de Cooper, vasos epigástricos superiores e ligamento inguinal.
- (E) ligamento inguinal, aponeurose do oblíquo externo e ligamento de cooper.

QUESTÃO 26

Do ponto de vista clínico, como critério de alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) pode ser empregada a tabela de Aldrete-Kroulik. Sendo assim, em um paciente de 20 anos, em pós-operatório de cirurgia de varizes de membros inferiores, movimentando os dois membros, respirando profundamente, tossindo e deglutindo, despertando-se ao chamado, apresentando pressão arterial 20% do nível pré-anestésico e SpO₂ > 92% em ar ambiente pode ser classificado com índice de Aldrete:

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

QUESTÃO 27

De acordo com Jameson et al. (2020), sobre Artrite Reumatoide (AR), assinale a opção correta.

- (A) A incidência de AR vai diminuindo entre 25 e 55 anos, atingindo um platô até os 75 anos e depois aumenta.
- (B) Os pacientes com AR costumam queixar de rigidez articular matinal que piora com a atividade física.
- (C) As principais articulações acometidas na AR inicialmente são as grandes articulações do joelho e cotovelos.
- (D) Manifestações extra-articulares podem se desenvolver durante a evolução clínica da AR em até 40% dos pacientes mesmo antes do aparecimento da artrite.
- (E) Os sítios cardiológicos de envolvimento mais frequente na AR são as válvulas.

QUESTÃO 28

O reflexo que responde às variações da pressão venosa central (PVC) e do átrio direito, por meio de receptores de estiramento presentes na parede atrial na junção cavoatrial, chama-se reflexo:

- (A) de bezold-jarisch.
- (B) de cushing.
- (C) barorreceptor.
- (D) de bainbridge.
- (E) parassimpático.

QUESTÃO 29

As lesões que envolvem a fise e a epífise historicamente causaram cessação de crescimento e deformidades angulares resultantes. A classificação mais comumente utilizada é a de Salter-Harris, que é baseada na aparência radiográfica da fratura. Com base nessa classificação, assinale a opção correta.

- (A) Fraturas do tipo I são separações epifisárias apenas através da fise, com ou sem luxação.
- (B) Fraturas do tipo II são a separação fisária com uma fratura através da epífise na articulação com incongruidade da articulação quando a fratura é desviada.
- (C) Fraturas do tipo III são fraturas de compressão ou esmagamento.
- (D) Fraturas do tipo IV são fraturas através da metáfise e da fise, sem acometimento da articulação.
- (E) Fraturas do tipo V têm uma porção metafisária anexada à epífise separada (sinal de Thurston-Holland) com a separação também através da fise.

QUESTÃO 30

A vigilância do desenvolvimento infantil é parte essencial do acompanhamento médico na consulta de puericultura. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- (A) Os saltos do desenvolvimento são definidos como a observação de mudanças comportamentais (sono, alimentação e irritabilidade) nos bebês frente à possibilidade da aquisição de uma nova habilidade.
- (B) Os sinais de alerta levantam a suspeita de anormalidade em uma área específica do desenvolvimento e são observados com a aquisição do marco de desenvolvimento relacionado.
- (C) O desenvolvimento compreende os domínios sensorial e motor com suas habilidades motoras grosseiras e habilidades motoras finas, apenas.
- (D) O contato visual escasso e a forte preocupação dos pais são sinais de alerta observados somente na criança pequena.
- (E) Na avaliação do desenvolvimento, não há uma diferença marcada entre os marcos do desenvolvimento baseados em escalas e os saltos do desenvolvimento.

QUESTÃO 31

Sobre a Diabetes Mellito e seus tratamentos, assinale a opção correta.

- (A) As sulfonilureias são de início de ação lenta e não diminuem a glicemia pós-prandial.
- (B) Os inibidores de alfa-glicosidase não diminuem a glicemia de jejum.
- (C) As biguanidas possuem custo elevado e costumam cursar com hipoglicemia.
- (D) Os agonistas dos receptores GLP-1 têm por efeito colateral o ganho de peso na grande maioria das vezes.
- (E) Os inibidores do cotransportador da sódio-glicose 2 (SGLT2) podem cursar com Cetoacidose diabética euglicêmica.

QUESTÃO 32

De acordo com Jameson et al. (2020), são componentes do Score SOFA:

- (A) relação Pao_2/Fio_2 , bilirrubinas, pressão arterial média, escala de coma de Glasgow e creatinina.
- (B) bilirrubinas, pressão arterial sistólica, escala de coma de Glasgow, ureia e plaquetas.
- (C) frequência cardíaca, pressão arterial média, plaquetas, relação Pao_2/Fio_2 e bilirrubinas.
- (D) pressão arterial diastólica, plaquetas, relação Pao_2/Fio_2 , frequência respiratória e ureia.
- (E) frequência cardíaca, plaquetas, escala de coma de Glasgow, relação Pao_2/Fio_2 e creatinina.

QUESTÃO 33

De acordo com Almeida Filho (2021), qual o problema metodológico que restringe o uso dos estudos ecológicos?

- (A) tipo de medida ecológica.
- (B) falácia ecológica.
- (C) nível de análise ecológica.
- (D) nível de inferência ecológica.
- (E) medida ambiental.

QUESTÃO 34

O desenvolvimento do sexo feminino é chamado de "via de desenvolvimento básico do embrião humano". Assim, qual é o hormônio que, na sua ausência, contribui para o desenvolvimento do sistema genital feminino?

- (A) Estrogênio.
- (B) Progesterona.
- (C) FSH.
- (D) Testosterona.
- (E) LH.

QUESTÃO 35

De acordo com Jameson et al. (2020), são tipos de choque, EXCETO:

- (A) distributivo.
- (B) cardiogênico.
- (C) hipovolêmico.
- (D) obstrutivo.
- (E) diferenciado.

QUESTÃO 36

O American College of Radiology recomendou o uso de *Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS)* para padronização da descrição de lesões mamográficas. No sistema BI-RADS há sete categorias de achados mamográficos (além dos incompletos). Assim, qual categoria BI-RADS é um achado suspeito e deve-se considerar a biopsia?

- (A) 0
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 6

QUESTÃO 37

É considerado como achado não desejável e significativo na avaliação das vias aéreas numa avaliação pré-anestésica:

- (A) distância tireoentoniana maior do que a largura de 3 dedos médios.
- (B) pescoço longo.
- (C) incisivos superiores curtos.
- (D) distância interincisivos menor do que 3 cm.
- (E) úvula visível com o paciente em posição sentada.

QUESTÃO 38

De acordo com o SEPSIS-3, os critérios para diagnóstico de choque séptico incluem:

- (A) SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica) ou necessidade de uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg.
- (B) sepse ou necessidade de uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg.
- (C) sepse e necessidade de uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg ou lactato sérico acima de 2 mmol/L.
- (D) sepse, necessidade de uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg e lactato sérico acima de 2 mmol/L a despeito de adequada ressuscitação com fluidos.
- (E) SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica) ou necessidade de uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg e lactato sérico acima de 2 mmol/L a despeito de adequada ressuscitação com fluidos.

QUESTÃO 39

De acordo com Almeida Filho (2021), a ocorrência de doenças ou agravos à saúde em uma dada população é denominada:

- (A) incidência.
- (B) prevalência.
- (C) letalidade.
- (D) mortalidade.
- (E) morbidade.

QUESTÃO 40

Uma mulher de 42 anos, assintomática, usuária crônica de anticoncepcional, ao realizar exames de rotina, teve achado de lesão única em lobo hepático direito de aproximadamente 2 cm na ultrassonografia abdominal. O médico que a atendeu solicitou uma tomografia a fim de investigar melhor o achado. A tomografia mostrou uma massa heterogênea bem delimitada que exhibe realce precoce na fase arterial. Sendo assim, qual é a melhor hipótese diagnóstica para o achado?

- (A) Adenoma hepático.
- (B) Hemangioma.
- (C) Hiperplasia nodular focal.
- (D) Pseudotumores inflamatórios do fígado.
- (E) Hiperplasia regenerativa nodular.

QUESTÃO 41

Na hernioplastia inguinal por videolaparoscopia, qual estrutura deve ser identificada por ser o principal ponto de ancoragem da tela?

- (A) Ligamento de Poupart.
- (B) Triângulo de Hasselbach.
- (C) Borda do músculo reto abdominal.
- (D) Ligamento Pectíneo.
- (E) Borda do músculo oblíquo externo.

QUESTÃO 42

A coluna vertebral usualmente compreende 33 vértebras divididas em cinco segmentos, da seguinte forma:

- (A) 5 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, 4 sacrais e 5 coccígeas.
- (B) 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas.
- (C) 5 cervicais, 15 torácicas e 4 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas.
- (D) 7 cervicais, 10 torácicas e 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas.
- (E) 5 cervicais, 15 torácicas e 5 lombares, 4 sacrais e 5 coccígeas.

QUESTÃO 43

Com relação à distribuição dermatomal e sensorial, o quarto e o quinto quirodactilos estão relacionados à raiz nervosa de:

- (A) C5
- (B) C6
- (C) C8
- (D) C7
- (E) D1

QUESTÃO 44

A triagem neonatal permite diagnósticos pré-sintomáticos. Em maio de 2021, foi aprovada a ampliação do teste do pezinho em todo o território brasileiro pelo SUS, com o qual será possível detectar até 50 doenças raras. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- (A) O teste do pezinho básico disponibilizado pelo SUS é capaz de detectar até 6 tipos de doenças com incorporação de outros testes dependendo do Estado da Federação.
- (B) O teste do pezinho é repetido em todos os recém-nascidos internados em UTI neonatal.
- (C) O teste do pezinho é realizado em sangue armazenado em papel filtro, colhido entre 24h e o quinto dia de vida.
- (D) A ampliação do teste do pezinho vai acrescentar na triagem apenas as imunodeficiências primárias e a atrofia muscular espinhal.
- (E) A imunodeficiência combinada grave (SCID) pode conduzir à morte dentro do 1º ano de vida com o devido tratamento.

QUESTÃO 45

De acordo com Jameson et al. (2020), sobre a endocardite infecciosa e os critérios de Duke modificados, assinale a opção correta.

- (A) Uma única amostra de hemocultura positiva para *Staphylococcus epidermidis* é um critério maior.
- (B) Evidência de acometimento endocárdico com uma nova deiscência parcial em uma valva protética é um critério maior.
- (C) Febre acima de 40 graus celsius é um critério maior.
- (D) Presença de nódulos de Osler, como fenômenos imunológicos é critério maior.
- (E) Uma única amostra de hemocultura positiva para *Coxiellaburnetii* é um critério menor.

QUESTÃO 46

A indicação da Tomografia Computadorizada (TC) de crânio no traumatismo cranioencefálico (TCE) na infância depende da gravidade do TCE. Quais são os critérios de gravidade do TCE de acordo com a faixa etária?

- (A) Baixo risco: criança assintomática, decorrido pelo menos 30 minutos do trauma, pode ser liberada para observação domiciliar.
- (B) Risco moderado: < 2 anos, hematoma subgaleal, perda de consciência > 5 segundos, mecanismo de trauma importante e mudança de comportamento.
- (C) Risco moderado: > ou = 2 anos, perda da consciência, vômitos, mecanismo de trauma simples e cefaleia resolvida.
- (D) Alto risco: < 2 anos, Escala de Coma de Glasgow (ECG) = 14, sem alteração do nível de consciência e suspeita de fratura de crânio.
- (E) Alto risco: > ou = 2 anos, ECG= 14, alteração do nível de consciência, mas sem sinais de fratura de base de crânio.

QUESTÃO 47

Dentre as causas do Crescimento Intrauterino Restrito (CIR), é correto afirmar que:

- (A) a gravidez gemelar não pode ser considerada uma das causas.
- (B) a artéria umbilical única não é uma das causas de CIR.
- (C) não se pode considerar a Síndrome Antifosfolípido (SAF) como causa.
- (D) placenta pequena, placenta previa e coriogioma são consideradas causas de CIR.
- (E) má nutrição materna não é considerada causa de CIR.

QUESTÃO 48

Paciente de 70 anos realizou correção de hérnia de parede abdominal com colocação de tela de Marlex e apresentou seroma na ferida operatória. Foi realizada aspiração por duas vezes do seroma, porém houve novo acúmulo de líquido seroso. Com base nessas informações, qual é a melhor conduta nesse caso?

- (A) Realizar novamente aspiração do local.
- (B) Abrir a incisão e limpar com gaze umedecida em regime ambulatorial.
- (C) Abrir a incisão, limpar e drenar o seroma em centro cirúrgico.
- (D) Realizar antibioticoterapia via oral em domicílio.
- (E) Remover a tela no centro cirúrgico.

QUESTÃO 49

De acordo com Sabiston (2015), assinale a opção que apresenta corretamente uma característica de um curativo ideal.

- (A) Custo-benefício.
- (B) Criar ambiente seco.
- (C) Excesso de exsudato.
- (D) Impedir trocas gasosas.
- (E) Não ter impermeabilidade.

QUESTÃO 50

A escala de Hinchey é uma importante classificação tomográfica para auxiliar a definição do tratamento da diverticulite aguda. Nesse contexto, qual estágio NÃO está corretamente descrito?

- (A) Estádio I: Abscesso pericólico ou mesentérico.
- (B) Estádio II: Abscesso pélvico bloqueado.
- (C) Estádio III: Peritonite difusa purulenta.
- (D) Estádio IV: Peritonite difusa fecal.
- (E) Estádio V: Peritonite difusa fecal com abscesso.


PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

TEXTO I

No Brasil, de acordo com estimativa da Abeat (Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas), 10% da população (cerca de 19 milhões) são dependentes de álcool. Em média, 32 mil mortes por ano estão relacionadas a doenças causadas pelo alcoolismo. Para a psiquiatra Camila Magalhães, coordenadora do Cisa (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool), o aumento de licenças não significa um crescimento no consumo de drogas, mas uma quebra de paradigmas nas empresas. "Hoje, em vez das empresas mandarem os funcionários embora por esse problema, preferem tratá-los." Camila Magalhães diz que o vínculo trabalhista depois do tratamento também facilita na recuperação. "A possibilidade de recaída é 40% maior quando a pessoa abandona o trabalho para se tratar", afirma.



Disponível em:

<http://consciencianotrabalho.blogspot.com/2012/10/alcoolismo-no-trabalho.html>. Acesso em 08 de maio de 2024. (adaptado)

TEXTO II

Intuitivamente, álcool e trabalho são duas coisas que não combinam. O álcool é um depressor do sistema

nervoso central e pode impactar o desempenho no trabalho de diversas formas, incluindo faltas, acidentes, discussões e brigas, demissões, entre outros tipos de perda de produtividade e renda. Contudo, a real dimensão do impacto do uso nocivo de álcool no trabalho e na economia vem sendo continuamente estudada, e novas pesquisas reiteram os perigos desta combinação. Sabe-se que as taxas de consumo excessivo de álcool podem ser mais altas em alguns setores, como os de construção civil e o de artes e entretenimento, e entre alguns segmentos específicos, como trabalhadores prestes a se aposentar e aqueles mais jovens. Algumas pessoas também podem utilizar, de forma equivocada, o álcool como um recurso para lidar com o estresse no trabalho. Para contextualização, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que de 20% a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas sob efeitos de algum tipo de droga, e que entre 3% a 5% da população de trabalhadores apresenta dependência de álcool e 25% são usuários de risco. O consumo de álcool no trabalho facilita a ocorrência de acidentes, provavelmente devido às alterações que provoca na diminuição de coordenação e equilíbrio, aumento de tempo de reação, alteração de julgamento e diminuição da acuidade.

Disponível em: <https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/358-como-o-uso-nocivo-de-alcool-piora-sua-relacao-com-o-trabalho>. Acesso em 08 de maio de 2024.

(adaptado)

TEXTO III

Profissões mais propensas a desenvolver o alcoolismo	
Bartenders	2,33 vezes mais
Operadores de máquinas	2,00 vezes mais
Garçons	1,87 vez mais
Pintores	1,85 vez mais
Cozinheiros	1,77 vez mais
Marinheiros	1,75 vez mais
Trabalhadores da construção civil	1,72 vez mais

Disponível em: <https://revistatopsaude.com.br/saude/alcoolismo-no-trabalho/>. Acesso em 08 de maio de 2024. (adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema "O alcoolismo e a sua interferência nas relações de trabalho". Dê um título ao seu texto.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas: o caderno é composto por uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha e uma prova de Redação. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à Redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 6 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 7 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **120 minutos**.
- 8 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 9 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta de material transparente;
 - b) escreva seu nome em letra legível no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- Não rasure esta folha.
- Não rabisque nas áreas de respostas.
- Faça marcas sólidas nos círculos.
- Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO:  CORRETO: 

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO				DV	P		G
5	7	2	0	7		2	4
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

02 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
21 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
23 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
25 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)

T
A
R
J
A

- 11 – Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 – O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 – O modelo de gabarito somente poderá ser destacado PELO FISCAL e após a entrega definitiva da prova pelo candidato. Caso o modelo de gabarito seja destacado pelo candidato, este será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50