

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

**(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO  
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2011)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**QUADRO DE MÉDICOS**

<b>ANESTESIOLOGIA</b>	<b>CARDIOLOGIA</b>
<b>CIRURGIA CARDIOVASCULAR</b>	<b>CIRURGIA GERAL</b>
<b>CIRURGIA PLÁSTICA</b>	<b>CLÍNICA MÉDICA</b>
<b>COLOPROCTOLOGIA</b>	<b>DERMATOLOGIA</b>
<b>GASTROENTEROLOGIA</b>	<b>GERIATRIA</b>
<b>GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA</b>	<b>INFECTOLOGIA</b>
<b>MEDICINA INTENSIVA</b>	<b>MEDICINA LEGAL</b>
<b>NEUROLOGIA</b>	<b>ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>
<b>PEDIATRIA</b>	<b>PNEUMOLOGIA</b>
<b>PSIQUIATRIA</b>	<b>RADIOLOGIA</b>

- 1) Em relação à reprodução humana, analise as afirmativas abaixo, e assinale a opção correta.
- I - Teratozoospermia é o aumento das formas anormais de espermatozoides.  
II - O citrato de clomifeno é uma medicação de primeira linha na indução da ovulação em pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos.  
III - A avaliação da permeabilidade tubária não faz parte da investigação básica do casal infértil, devendo ser solicitada apenas por especialista em reprodução assistida.  
IV - A metaplasia celômica e o transplante ectópico de tecido endometrial são teorias para explicar a histogênese da endometriose.  
V - Com os avanços das técnicas de reprodução assistida e criopreservação de embriões, a idade deixou de ser um fator determinante no sucesso do tratamento.
- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  
(C) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.  
(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.  
(E) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- 2) Assinale a opção que apresenta um impedimento para o fechamento espontâneo da fístula do intestino delgado.
- (A) Débito menor que 200 ml.  
(B) Enterite por radiação.  
(C) Lesão puntiforme intestinal.  
(D) Trajeto fistuloso pequeno.  
(E) Ausência de obstrução intestinal.
- 3) Qual dos marcadores abaixo, quando positivo isoladamente, é indicativo de que a criança foi vacinada para hepatite B mas nunca foi infectada pelo vírus dessa doença?
- (A) AgHBs.  
(B) AgHBe.  
(C) Anti - HBe.  
(D) Anti - HBs.  
(E) Anti - HBC.

- 4) A avaliação da idade gestacional de um recém-nascido poderá ser feita
- (A) pelo método de Capurro.  
(B) pela escala de Apgar.  
(C) pela escala de Glasgow.  
(D) pela escala de Smith.  
(E) pela escala de Tscherne.
- 5) Qual o agente etiológico mais comum da Osteomielite Hematogênica?
- (A) Enterococcus.  
(B) Klebsiella.  
(C) Staphylococcus aureus.  
(D) Proteus Mirabilis.  
(E) Streptococcus.
- 6) Em relação à toxemia gravídica é correto afirmar que:
- (A) quando a Síndrome HELLP manifesta seus primeiros sinais e sintomas, sempre há um episódio hipertensivo associado.  
(B) a tríade laboratorial clássica da Síndrome HELLP é composta pela hemólise, pela elevação de enzimas hepáticas e pela trombocitose.  
(C) o edema por ser um sintoma comum na gravidez normal foi retirado da tríade sintomática da pré-eclampsia, diferente da hipertensão e da proteinúria.  
(D) a eclâmpsia é a forma mais grave de toxemia gravídica e está caracterizada pela presença de síncope e hematúria associada aos sintomas clássicos.  
(E) a lesão renal associada à toxemia gravídica é a nefrite por acúmulo de IgA na membrana dos túbulos renais.
- 7) O sinal de Thurston-Holland está presente na lesão fisária Salter-Harris
- (A) I  
(B) II  
(C) III  
(D) IV  
(E) V

- 8) Em relação à diverticulite colônica, é correto afirmar que
- (A) é uma infecção colônica intraluminal.
  - (B) o ceco é o segmento do intestino mais acometido.
  - (C) todos os casos são de tratamento cirúrgico de urgência.
  - (D) não tem relação com a dieta.
  - (E) o uso da morfina deve ser evitado.
- 9) Fraturas claviculares podem exigir redução aberta e fixação internas nas seguintes situações, EXCETO:
- (A) pseudoartrose.
  - (B) fraturas do terço médio.
  - (C) envolvimento neurovascular.
  - (D) ombro flutuante.
  - (E) fratura exposta.
- 10) O mesotelioma está associado à exposição crônica de:
- (A) tabaco.
  - (B) sílica.
  - (C) asbesto.
  - (D) alumínio.
  - (E) cobalto.
- 11) A Endocardite de Libman- Sacks é uma manifestação cardíaca grave
- (A) do Lupus Eritematoso Sistêmico.
  - (B) da Artrite Reumatoide.
  - (C) da Hepatite B.
  - (D) da Poliarterite Nodosa.
  - (E) da Febre Reumática.
- 12) Em relação à fisiologia do ciclo menstrual é correto afirmar que:
- (A) o GnRH é produzido na adeno-hipófise e secretado de forma pulsátil para a circulação porta.
  - (B) o desenvolvimento do folículo ovariano é exclusivamente dependente do FSH.
  - (C) quando o corpo lúteo do ciclo anterior se extingue, a produção lútea de progesterona e inibina-A diminui, permitindo aumento dos níveis de FSH.
  - (D) as células da granulosa produzirão androgênios que são convertidos pelas células da teca em estrogênio.
  - (E) a queda nos níveis de estrogênio causa um pico de secreção hipofisária de LH que deflagra a ovulação.

- 13) O Linfoma Malt está associado ao seguinte agente infeccioso:
- (A) HTLV1.
  - (B) Vírus Epstein Barr.
  - (C) HIV.
  - (D) Herpesvirus humano 8.
  - (E) Helicobacter Pylori.
- 14) Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta maior risco de ressangramento nas doenças pépticas ulcerosas.
- (A) Úlceras menores de 2,0cm.
  - (B) Lesões localizadas em parede anterior de duodeno.
  - (C) Úlceras com coágulo aderente.
  - (D) Vaso visível não sangrante.
  - (E) Leito da úlcera não sangrante, limpo.
- 15) Além da cardiotocografia basal (CTG), qual exame está incluso na avaliação do Perfil Biofísico Fetal (PBF) ?
- (A) Dopplerfluxometria obstétrica (DFM) .
  - (B) Avaliação do Líquido Amniótico.
  - (C) DFM + USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico (LA) , Dopplert dos movimentos fetais (MF) e dos movimentos respiratórios (MR) .
  - (D) USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico (LA) , dos movimentos fetais (MF) e dos movimentos respiratórios (MR) .
  - (E) USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico (LA) , dos movimentos fetais (MF) e estimativa do peso fetal.
- 16) O ovo anembriônado é um abortamento do tipo:
- (A) retido.
  - (B) incompleto.
  - (C) completo.
  - (D) habitual.
  - (E) infectado.

- 17) A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) está associada com aproximadamente 90% das neoplasias intraepiteliais (NIC) do colo uterino. Assinale a opção correta em relação a esta doença pré-invasiva do colo uterino.
- (A) A taxa de regressão espontânea de NIC 1 é muito baixa, sem qualquer tipo de tratamento.  
(B) O tratamento preferido nos casos de NIC 2 e NIC 3 é a conização do colo uterino.  
(C) Uma vez identificada uma alteração colposcópica sugestiva de infecção por HPV, será indicada a realização de cirurgia de alta frequência (CAF) para diagnóstico de lesões intra-epiteliais.  
(D) Segundo o Sistema BI-RADS 2001, para classificação do exame de papanicolau, são utilizados os termos: células escamosas atípicas (ASC), lesão escamosa de baixo grau (LSIL) e lesão escamosa de alto grau (HSIL).  
(E) Os principais achados anormais na colposcopia são epitélio acetobranco, leucoplasia, pontilhado, mosaico e padrão vascular atípico.
- 18) Qual das opções abaixo apresenta indicação de colecistectomia eletiva?
- (A) Colecistite aguda.  
(B) Colecistite enfisematoso.  
(C) Empiema da vesícula biliar.  
(D) Discinesia Biliar.  
(E) Perfuração da vesícula biliar.
- 19) Qual dos itens citados abaixo, constitui causa de abdome agudo isquêmico?
- (A) Síndrome de Mallory-Weiss.  
(B) Diverticulite de Meckel.  
(C) Doença de Buerger.  
(D) Envenenamento por aranha Viúva Negra.  
(E) Síndrome de Boerhaave.
- 20) Assinale a opção que apresenta um fator considerado de risco para Acidente Vascular Encefálico na Fibrilação Atrial.
- (A) Idade menor que 75 anos.  
(B) Prolapso de Válvula Mitral.  
(C) Diabetes Melito.  
(D) Insuficiência Mitral.  
(E) Amiloidose.

- 21) A profilaxia da doença hemorrágica do recém-nascido é feita com vitamina
- (A) A.  
(B) B.  
(C) D.  
(D) E.  
(E) K.
- 22) Um paciente ao realizar exames de sangue obteve o seguinte resultado: Anti HCV negativo, Anti-HBS positivo, HBs Ag negativo, HBe Ag negativo, e Anti HBC IgG positivo. Nesse caso, qual o diagnóstico correto do paciente?
- (A) Hepatite B aguda com alta infectividade.  
(B) Hepatite B crônica com alta infectividade.  
(C) Hepatite C crônica.  
(D) Exposição ao vírus B com resolução da infecção.  
(E) Vacinação efetiva da Hepatite B.
- 23) Na anatomia do cotovelo, a estrutura nervosa que cruza esta articulação, posteriormente, ao epicôndilo medial é o nervo
- (A) ulnar.  
(B) músculo-cutâneo.  
(C) radial.  
(D) interósseo posterior.  
(E) mediano.
- 24) Assinale a opção INCORRETA em relação às patologias consideradas Vasculites primárias.
- (A) Granulomatose de Wegener.  
(B) Doença de Kawasaki.  
(C) Púrpura de Henoch- Schönlein.  
(D) Síndrome de Behçet.  
(E) Doença do Soro.
- 25) Assinale a opção que apresenta a principal bactéria anaeróbica isolada na apendicite perfurada.
- (A) *Bacteroids fragilis*.  
(B) *Escherichia coli*.  
(C) *Streptococcus viridans*.  
(D) *Pseudomonas aeruginosa*.  
(E) *Staphylococcus aureus*.

- 26) Segundo a classificação de Tscherne, para fraturas expostas da tíbia, uma laceração da pele através de um fragmento ósseo (de dentro para fora), com pouca ou nenhuma contusão da pele, é uma lesão de grau:
- (A) 0  
(B) 1  
(C) 2  
(D) 3  
(E) 4
- 27) Assinale a opção correta quanto à classificação dos métodos contraceptivos.
- (A) "Contracepção natural" - método de Billings (muco cervical) e condom.  
(B) Métodos de barreira - espermicidas vaginais e dispositivo intrauterino (DIU).  
(C) Métodos cirúrgicos - laqueadura tubárea e diafragma.  
(D) Métodos hormonais - implante subdérmico de levonorgestrel e anel vaginal.  
(E) Métodos não hormonais - coito interrompido e "minipílula".
- 28) Algumas drogas utilizadas na terapêutica médica, também são consideradas carcinogênicas. Dentre as citadas abaixo, qual está relacionada, principalmente, ao câncer de bexiga?
- (A) Azatioprina.  
(B) Ciclofosfamida.  
(C) Clorambucil.  
(D) Tamoxifeno.  
(E) Estrógenos.
- 29) O Eletrocardiograma é o primeiro exame complementar realizado na suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. No Infarto Agudo secundário à obstrução da Artéria Coronária Descendente Anterior observa-se supradesnívelamento do segmento ST nas seguintes derivações:
- (A) V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL.  
(B) D2, D3 e AVF.  
(C) V1 e V2.  
(D) D1 e AVL apenas.  
(E) D1, AVL, V5 e V6 apenas.

- 30) Em relação ao conhecido triângulo de Hesselbach, é correto afirmar que
- (A) suas estruturas limitam superiormente o canal inguinal.
  - (B) os vasos epigástricos inferiores funcionam como sua margem medial.
  - (C) o ligamento inguinal funciona como sua margem superior.
  - (D) a bainha do músculo reto abdominal funciona como sua margem lateral.
  - (E) é o local de ocorrência das hérnias inguinais diretas.
- 31) Assinale a opção que apresenta uma característica do recém-nascido Pós-Termo.
- (A) Pregas plantares mal definidas sobre a parte anterior da planta dos pés.
  - (B) Mamilo apenas visível.
  - (C) Pele coreácea, rachada e enrugada.
  - (D) Pavilhão auricular parcialmente encurvado na borda.
  - (E) Glândula mamária não palpável.
- 32) Nas fraturas do colo de fêmur, os percentuais de pseudoartrose e de necrose avascular da cabeça femoral estão, frequentemente, relacionados com as seguintes condições, EXCETO:
- (A) a idade do paciente.
  - (B) o método de fixação.
  - (C) a demora no tratamento.
  - (D) a qualidade da redução.
  - (E) a mobilização precoce.

- 33) Um paciente deu entrada no setor de emergência, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo de baixa velocidade, na região cervical esquerda, conhecida como Zona II. Encontrava-se agitado, apresentando hemoptise e enfisema subcutâneo significativo. Qual será a abordagem correta, nesse caso?
- (A) Exploração cirúrgica imediata.  
(B) Realização de tomografia computadorizada com contraste, por ser de mais fácil realização, menos invasiva e ter resultado semelhante ao da angiografia.  
(C) Apenas observar evolução clínica, pois o paciente está hemodinamicamente estável.  
(D) Realização de angiografia, para identificação de lesão vascular.  
(E) Realização de broncoscopia, para investigação de lesão de via aérea.
- 34) A vacina tríplice viral é composta por três agentes atenuados, que são:
- (A) sarampo, caxumba, e rubéola.  
(B) sarampo, caxumba, e hepatite B.  
(C) difteria, coqueluche, e tétano.  
(D) poliomielite, influenza, e febre amarela.  
(E) poliomielite, hepatite A, e hepatite B.
- 35) Com relação às luxações do quadril, é correto afirmar que:
- (A) as luxações anteriores são frequentes.  
(B) a incongruência pós redução não está relacionada a fragmento intra-articular.  
(C) o trauma de alta energia é frequente.  
(D) na luxação posterior, o acesso anterior aumenta a chance de necrose da cabeça do fêmur.  
(E) a manobra de Stimson é mais utilizada para luxação anterior.

- 36) Em relação às doenças da mama, assinale a opção correta.
- (A) A alteração fibrocística da mama é a lesão mais comum da mama em mulheres acima de 55 anos.  
(B) A maioria dos tumores filoides da mama são benignas, unilaterais e caracterizam-se por um crescimento rápido.  
(C) Vários estudos comprovam a associação frequente entre abcesso subareolar de repetição e alcoolismo.  
(D) Cerca de 40 a 45% dos cânceres de mama têm fundo hereditário e estão relacionados à presença da mutação genética do tipo Her-2.  
(E) A American Cancer Society recomenda que todas as mulheres, independente do risco alto ou baixo para desenvolver câncer de mama, iniciem o rastreamento mamográfico aos 40 anos.
- 37) Qual das doenças exantemáticas abaixo é de etiologia viral?
- (A) Escarlatina.  
(B) Doença de Kawasaki.  
(C) Miliária rubra.  
(D) Febre maculosa Brasileira.  
(E) Mononucleose infecciosa.
- 38) Assinale a opção que apresenta um tumor ósseo maligno primário.
- (A) Defeito cortical fibroso.  
(B) Osteossarcoma.  
(C) Encondroma.  
(D) Osteocondroma.  
(E) Cisto ósseo.
- 39) A estrutura neurológica que passa pelo túnel do carpo é o nervo
- (A) ulnar.  
(B) radial.  
(C) mediano.  
(D) interósseo posterior.  
(E) axilar.

- 40) Paciente masculino, 13 anos, negro, acima do peso para a idade, refere dor no quadril esquerdo com irradiação para a virilha e face interna do joelho. Apresenta claudicação e no exame físico limitação de movimentos, sobretudo de rotação medial do quadril esquerdo. Qual o provável diagnóstico?
- (A) Deslizamento da epífise da cabeça do fêmur.  
(B) Artrite séptica.  
(C) Osteomielite.  
(D) Luxação do quadril.  
(E) Fratura do fêmur.
- 41) Em relação ao Diabetes gestacional, assinale a opção correta.
- (A) Uma das principais características do Diabetes gestacional é sua manutenção após a gravidez.  
(B) O teste recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o diagnóstico do diabetes gestacional é o teste de tolerância à glicose oral (TTGO), com 75g de glicose que deverá ser realizado logo no primeiro trimestre de gestação.  
(C) A Diabetes gestacional oferece risco de complicações maternas, porém não tem repercussões importantes no feto.  
(D) O Diabetes gestacional, se não tratado adequadamente, pode cursar com macrossomia fetal, além de hipoglicemias e hiperbilirrubinemia neonatal.  
(E) Quando presente a macrossomia fetal, a via de parto preferencial será a vaginal.
- 42) O nível de consciência da criança comatosa costuma variar bastante, dentro de um determinado intervalo de tempo, dependendo da etiologia e da evolução do coma. De maneira geral, com a finalidade de padronizar a avaliação destas crianças, são utilizadas escalas, como a de coma de Glasgow modificada para crianças. Qual a pontuação máxima dessa escala?
- (A) 5  
(B) 10  
(C) 15  
(D) 20  
(E) 25

- 43) A Quimioprofilaxia de um recém-nascido de mulher infectada pelo HIV deverá ser realizada com:
- (A) estamidina.  
(B) nevirapina.  
(C) zidovudina (AZT).  
(D) ritonavir.  
(E) lopinavir.
- 44) Assinale a opção que apresenta o antibiótico que será utilizado na profilaxia dos contatos íntimos, de pacientes maiores de 18 anos com meningite meningocócica.
- (A) Ciprofoxacina.  
(B) Sulfonamida.  
(C) Eritromicina.  
(D) Cefalotina.  
(E) Clindamicina.
- 45) Assinale a opção que apresenta um medicamento associado à causa definitiva de pancreatite.
- (A) Acetaminofen.  
(B) Isoniazida.  
(C) Furosemida.  
(D) Alfa Metil DOPA.  
(E) Procainamida.
- 46) As opções abaixo apresentam sinais de alarme na dengue, EXCETO:
- (A) dor abdominal intensa e contínua.  
(B) hepatomegalia dolorosa.  
(C) desconforto respiratório.  
(D) queda bruta das plaquetas.  
(E) artralgia.

- 47) Em relação às alterações do líquido amniótico, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A Oligodramnia está associada a condições fetais graves como doença renal, crescimento intrauterino restrito (CIUR), amniorrexe prematura e pós-maturidade.  
(B) A Oligodramnia acentuada já no segundo trimestre de gestação é sinal de péssimo prognóstico com possível morte fetal intraútero.  
(C) Há uma grande incidência de Polidramnia na doença hemo-lítica perinatal, na gemelaridade, na diabetes gestacional e nas infecções fetais.  
(D) A amniorrexe prematura na portadora de Polidramnia é acompanhada de grande incidência de prolapso de cordão umbilical.  
(E) A Polidramnia confere um caráter protetor ao quarto período do parto, diminuindo a incidência de hemorragias.
- 48) Assinale a opção que apresenta uma causa de Pseudo-Hiponatremia.
- (A) Hipotireoidismo.  
(B) Uso de diuréticos.  
(C) Insuficiência Renal Crônica.  
(D) Deficiência de glicocorticoides.  
(E) Hiperproteinemia.
- 49) Qual o tratamento de primeira escolha do Abcesso Hepático Amebiano?
- (A) Cloroquina.  
(B) Ampicilina.  
(C) Albendazol.  
(D) Ivermectina.  
(E) Metronidazol.
- 50) A fratura do terço proximal da ulna com luxação da cabeça do rádio é conhecida como
- (A) Fratura de Smith.  
(B) Fratura de Sanders.  
(C) Fratura-luxação de Neer.  
(D) Fratura-luxação de Rockwood.  
(E) Fratura-luxação de Monteggia.