

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE
PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP/2022)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

De acordo com Silva (2021), assinale a opção que apresenta a correspondência correta entre a classificação e o medicamento.

- (A) Coagulante - enoxaparina sódica.
- (B) Antilipêmico - fenobarbital.
- (C) Anticoagulante - vitamina K.
- (D) Antitrombótico para infarto agudo do miocárdico - estreptoquinase.
- (E) Corticosteroide - tramadol.

QUESTÃO 2

De acordo com a regra de Nägele, qual será a data provável do parto de uma gestante, cuja data da última menstruação (DUM) foi em 20/6/2022 ?

- (A) 28/03/2023
- (B) 28/02/2023
- (C) 27/01/2023
- (D) 27/02/2023
- (E) 27/03/2023

QUESTÃO 3

Segundo Funasa (2001), como é denominada a complicação rara, grave e de difícil manejo em acidentes offídicos, que decorre da compressão do feixe vasculo-venoso consequente ao grande edema que se desenvolve no membro atingido, produzindo isquemia de extremidade, com dor intensa, parestesia, diminuição da temperatura distal, cianose e déficit motor?

- (A) Síndrome compartimental.
- (B) Abscesso.
- (C) Necrose.
- (D) Epistaxe.
- (E) Hemoptise.

QUESTÃO 4

De acordo com o Manual AIDPI Neonatal (2014), a administração de vitamina K deve ser realizada de forma rotineira no recém-nascido, a fim de evitar:

- (A) doença hemorrágica do recém-nascido.
- (B) icterícia neonatal.
- (C) infecção neonatal.
- (D) desnutrição.
- (E) deficiência da biotinidase.

QUESTÃO 5

Segundo Lima e Matão (2010), assinale a opção cujo o sufixo corresponde a definição correta.

- (A) ectomia = abertura.
- (B) stomia= reparo.
- (C) plastia= sutura.
- (D) tomia= retirada.
- (E) pexia= fixação.

QUESTÃO 6

De acordo com a Anvisa (2017), sobre a seleção do cateter intravascular periférico e sítio de inserção, é correto afirmar que: |

- (A) deve-se selecionar, prioritariamente, o cateter periférico com base nas condições de acesso venoso.
- (B) deve-se utilizar cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes e nutrição parenteral.
- (C) os cateteres com menor calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
- (D) caso o adulto não caminhe, deve-se considerar as veias dos pés.
- (E) deve-se preferir a região de flexão.

QUESTÃO 7

Segundo Lima e Matão (2010), assinale a opção correta sobre a criptorquidia:

- (A) Excesso de líquido dentro da cavidade intracraniana e no consequente aumento do tamanho da cabeça.
- (B) Ausência de um ou ambos os testículos na bolsa escrotal.
- (C) Malformação da coluna, na qual ocorre uma abertura devido ao não fechamento da parte posterior das lâminas vertebrais.
- (D) Obstrução do esôfago, impedindo o trânsito livre e contínuo da faringe até o estômago.
- (E) Posição anormal da abertura da uretra.

QUESTÃO 8

Para um determinado paciente foi prescrito a seguinte solução: soro fisiológico 0,9% 500 ml para ser infundido em 6 horas. Assim, de acordo com o Manual do técnico de enfermagem (2010), quantas gotas por minuto deverão ser infundidas nesse período?

- (A) 30.
- (B) 29.
- (C) 28.
- (D) 26.
- (E) 25.

QUESTÃO 9

Segundo Potter (2013), sobre os cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao procedimento de paracentese, analise as afirmativas e assinale a opção correta.

- I- monitorar sinais vitais, SpO₂ e a simetria dos movimentos da parede torácica.
- II- verificar a circunferência torácica.
- III- verificar peso.
- IV- inspecionar o curativo do local da punção para verificar sangramento, edema e eritema.
- V- avaliar nível de dor usando escala de 0 a 10, pois dor abdominal severa indica uma possível perfuração da bexiga.

- (A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 10

No Brasil existem três gêneros de aranhas de importância médica: *Phoneutria*, *Loxosceles* e *Latrodectus*. Os acidentes causados por *Latrodectus* têm sido relatados na região Nordeste e ocorrem principalmente em pacientes do sexo masculino, na faixa etária de 10 a 30 anos (FUNASA, 2001). Das manifestações sistêmicas decorrentes desses acidentes, podem ocorrer, dentre outras manifestações, a queda anormal da pálpebra superior sobre a pupila e a dilatação constante das pupilas. Essas manifestações são denominadas, respectivamente, de:

- (A) ectrópio e miose.
- (B) ptose e midríase.
- (C) ptose e miose.
- (D) miose e entrópico.
- (E) midríase e ptose.

QUESTÃO 11

Segundo Potter (2017), qual é o propósito do procedimento cirúrgico paliativo?

- (A) Confirmar o diagnóstico.
- (B) Realizar a remoção de parte do corpo.
- (C) Restaurar a função perdida ou reduzida como resultado de anomalias congênitas.
- (D) Aliviar ou reduzir a intensidade dos sintomas da doença.
- (E) Melhorar a aparência pessoal.

QUESTÃO 12

Durante o exame clínico das mamas são desenvolvidas as etapas de inspeção e palpação a fim de detectar precocemente sugestivas alterações mamárias. Nesse procedimento, por meio da inspeção, pode ser observada a presença de:

- (A) nódulos.
- (B) secreção serosa.
- (C) linfonodos.
- (D) temperatura da pele.
- (E) assimetrias.

QUESTÃO 13

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), a aplicação subcutânea da insulina pode ser realizada nos braços, abdômem, coxas e nádegas. Nesse contexto, a absorção ocorre em maior velocidade:

- (A) nos braços.
- (B) no abdômem.
- (C) nas coxas.
- (D) nas nádegas.
- (E) no antebraço.

QUESTÃO 14

De acordo com Potter (2017), assinale a opção que apresenta o paciente com indicação do posicionamento em decúbito lateral esquerdo a 30 graus.

- (A) Hemiplégico à esquerda.
- (B) Com sinais de lesão por pressão estágio I em trocanter direito.
- (C) Com dispneia.
- (D) Com hipotensão.
- (E) Em pós-operatório de artroplastia de ombro esquerdo.

QUESTÃO 15

Com base na classificação das lesões por pressão, Analise as seguintes características: perda da espessura total do tecido; gordura subcutânea visível; osso, tendão e músculos não expostos; presença de esfacelo, mas sem obscurecer a profundidade da perda tecidual. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta a categoria / estágio supracitada.

- (A) Não estádiável/ não classificada.
- (B) Categoria / estágio I.
- (C) Categoria / estágio IV.
- (D) Categoria / estágio III.
- (E) Categoria / estágio II.

QUESTÃO 16

Em decorrência da ação tóxica de alguns tipos de veneno ofídico, a rabdomiólise é a manifestação clínica mais evidente da necrose da musculatura esquelética, liberando substâncias para o soro que posteriormente serão excretadas pela urina. Segundo o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA, 2001), a essa excreção urinária denomina-se:

- (A) nictúria.
- (B) piúria.
- (C) hematúria.
- (D) glicosúria.
- (E) mioglobinúria.

QUESTÃO 17

De acordo com Potter (2013), com relação a administração de alimentação através de sonda nasointestinal (SNE) de pequeno calibre, assinale a opção correta.

- (A) A fórmula fria não provoca cólicas gástricas, pois o líquido é aquecido pela boca e pelo esôfago.
- (B) Não se deve administrar fórmula em temperatura ambiente, devido ao risco de provocar cólicas.
- (C) Não é necessário o uso de técnica asséptica para manipular os componentes do sistema de alimentação, como fórmula e conexões.
- (D) Deve-se manter a cabeceira a 0° durante a alimentação por SNE.
- (E) Deve-se verificar o volume residual gástrico antes de cada alimentação intermitente e a cada 4 a 6 horas para alimentações contínuas.

QUESTÃO 18

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34 (2013), como são denominadas as escutas irreais, em terceira pessoa, que comentam atos de pessoas, geralmente muito assustadores e com pouca relação com os acontecimentos recentes?

- (A) Ilusões.
- (B) Alucinações.
- (C) Transgressão.
- (D) Vertigem.
- (E) Angústia.

QUESTÃO 19

Assinale a opção que representa os "quatro P's", como são conhecidos os sinais e sintomas característicos que levantam suspeita de Diabetes Mellitus.

- (A) Piúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
- (B) Piúria, palidez, polifagia e perda de memória.
- (C) Poliúria, palidez, prurido e perda de apetite.
- (D) Piúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
- (E) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.

QUESTÃO 20

Carbonato de lítio, carbamazepina e ácido valpróico são fármacos voltados ao tratamento de transtornos mentais. Assinale a opção que apresenta a classe a que esses fármacos pertencem.

- (A) Estabilizadores de humor.
- (B) Antidepressivos.
- (C) Neurolépticos.
- (D) Benzodiazepínicos.
- (E) Antipsicóticos.

QUESTÃO 21

De acordo com Potter (2017), as intervenções de enfermagem para pacientes que estão imóveis ou têm fatores de risco para lesão por pressão concentram-se na prevenção. Assim, das medidas básicas para prevenir lesões, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Deve-se realizar mudança de decúbito a cada 2 horas e, quando necessário, reposicionar o paciente no leito, usando o lençol de transferência.
- (B) Deve-se manter a pele seca e livre de maceração.
- (C) Após cada evacuação, deve-se limpar a área e proteger a pele com pomada de barreira contra umidade.
- (D) Para os pacientes com indicação, deve-se posicionar o paciente em um giro lateral de 30° e limitar a elevação da cabeceira a 30°.
- (E) Durante as mudanças de decúbito deve-se arrastar o paciente no leito, para evitar as lesões de cisalhamento e atrito.

QUESTÃO 22

Durante a passagem de plantão, o técnico de enfermagem informou os sinais vitais de cinco dos seus pacientes internados na enfermaria de um hospital. Analise as opções a seguir e assinale aquela que apresenta o paciente que deverá ser avaliado primeiro.

- (A) Idosa, 78, em pós-operatório de cirurgia no quadril, FR 14 irpm, PA 138x88 mmHg.
- (B) Idoso, 64 anos, internado com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral isquêmico, temperatura 37,4°C e FC 80 bpm.
- (C) Mulher, 55 anos, internada com diagnóstico de pneumonia, FR 28 irpm e SpO₂ 88%.
- (D) Homem, 75 anos, internado por úlceras venosas por diabetes, FC 82 bpm e temperatura 37,2° C.
- (E) Idoso, 85 anos, internado por infecção de trato de urinário e pneumonia, FR 16 irpm, PA 130x80 mmHg e SpO₂ 96%.

QUESTÃO 23

Segundo Lima e Matão (2010), sobre a dequitação é correto afirmar que :

- (A) inicia com a dilatação completa, terminando com a expulsão do feto.
- (B) corresponde à primeira hora após a expulsão da placenta .
- (C) corresponde ao terceiro período do parto. Segue-se à expulsão do feto, indo até a expulsão completa da placenta e das membranas.
- (D) é considerado o primeiro período do parto, normalmente o mais longo deles.
- (E) corresponde à segunda hora após a expulsão da placenta.

QUESTÃO 24

Um médico prescreveu cetoprofeno 100 mg diluído em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para infundir em 20 minutos em um paciente com queixa de dor lombar. Com base nas informações apresentadas, calcule quantas gotas por minuto serão necessárias para administrar o medicamento e assinale a opção correta.

- (A) 50
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 150
- (E) 200

QUESTÃO 25

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 23 (2015), dos sinais indicativos da técnica de amamentação, assinale a opção que apresenta um sinal INADEQUADO:

- (A) boca bem aberta.
- (B) lábio inferior virado para fora.
- (C) queixo tocando a mama.
- (D) bebê com cabeça e tronco alinhados.
- (E) ruídos na língua.

QUESTÃO 26

De acordo com Potter (2013), com relação aos cuidados de enfermagem durante a realização de aspiração traqueal, assinale a opção correta.

- (A) no método de aspiração traqueal aberta, o cateter pode ser reutilizável por mais de uma sessão de aspiração.
- (B) na aspiração fechada envolve o uso de um cateter de aspiração estéril reutilizável.
- (C) recomenda-se instilação de 200 ml de soro fisiológico nas vias aéreas artificiais para melhorar a remoção de secreção.
- (D) girar o cateter durante a aspiração diminui a remoção das secreções aderidas nas vias aéreas.
- (E) na aspiração aberta são utilizadas luvas não estéreis, por se tratar de um procedimento contaminado.

QUESTÃO 27

A picada das formigas pode ser muito dolorosa e pode provocar complicações como anafilaxia, necrose e infecções secundárias. Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), assinale a opção que apresenta o tipo de compressa a ser utilizada no tratamento imediato dessa picada:

- (A) compressas frias.
- (B) compressas mornas.
- (C) compressas quentes.
- (D) compressa emoliente.
- (E) compressa seca.

QUESTÃO 28

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), a insulina influencia o metabolismo da glicose na maioria dos tecidos. As insulinas mais comuns são as de ação rápida (regular) e as de ação intermediária (Neutral Proamine Hagedorn-NPH). Sobre a insulina regular é correto afirmar que:

- (A) é utilizada para o controle glicêmico basal.
- (B) pico de ação de 4 a 10 horas.
- (C) início da ação de 30 a 60 minutos.
- (D) recomenda-se dose noturna às 22h.
- (E) tem ação intermediária.

QUESTÃO 29

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34 (2013), como é denominada a alteração dos afetos, com perturbação do humor, onde se observam, pelo menos, 2 períodos que variam do excitado ao deprimido?

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Estresse pós-traumático.
- (C) Somatização.
- (D) Fobia.
- (E) Distúrbio bipolar.

QUESTÃO 30

Os acidentes ofídicos têm importância em virtude de sua grande frequência e gravidade. Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), assinale a opção que NÃO apresenta primeiros socorros para esses acidentes.

- (A) Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão.
- (B) Manter o paciente deitado e hidratado.
- (C) Fazer torniquete ou garrote do membro afetado.
- (D) Se possível, levar o animal para identificação.
- (E) Procurar o serviço médico mais próximo.

QUESTÃO 31

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento da Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Assim, assinale a opção que apresenta os hipoglicemiantes orais disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos (Rename) de 2012.

- (A) Metildopa, glibenclamida e gliclazida.
- (B) Hidroclorotiazida, glibenclamida e glicose hipertônica.
- (C) Cloridrato de metformina, glibenclamida e sinvastatina.
- (D) Gliclazida, cloridrato de metformina e glibenclamida.
- (E) Hidroclorotiazida, cloridrato de metformina e gliclazida.

QUESTÃO 32

De acordo com Potter (2017), com relação as precauções baseadas na transmissão (nível 2), utilizadas para tipos específicos de paciente, correlacione as categorias de precauções com o tipos de barreiras de proteção e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

CATEGORIAS DE PRECAUÇÕES

- I- Precaução ambiental (aerossóis) - relaciona-se às doenças que são transmitidas por gotículas menores, que permanecem no ar por longos períodos de tempo (ex. tuberculose pulmonar).
- II- Precaução de gotículas - concentra-se nas doenças que são transmitidas por gotículas grandes (ex. faringite estreptocócica).
- III- Precaução de contato - usada para contato direto e indireto com o paciente e o ambiente (ex. sarna).
- IV- Ambiente protetor - projetado para pacientes que tenham realizado transplante ou terapia gênica. (ex. transplante de células troncos).

TIPOS DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO

- () Quarto privativo, máscara cirúrgica e higiene adequada das mãos.
- () Quarto privativo com fluxo de ar positivo, máscara cirúrgica e higiene adequada das mãos.
- () Quarto privativo, uso de luvas, capote e higiene adequada das mãos.
- () Quarto privativo com fluxo de ar com pressão negativa, máscara de proteção respiratória N95 e higiene adequada das mãos.

- (A) (IV) (I) (II) (III)
- (B) (II) (IV) (III) (I)
- (C) (III) (II) (I) (IV)
- (D) (II) (III) (IV) (I)
- (E) (I) (IV) (III) (II)

QUESTÃO 33

Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), qual a via de administração da soroterapia antiofídica?

- (A) Intravenosa.
- (B) Subcutânea.
- (C) Intratecal.
- (D) Intradérmica.
- (E) Oral.

QUESTÃO 34

De acordo com a Anvisa (2017), sobre a higiene das mãos antes e após a inserção de cateteres intravasculares e para qualquer tipo de manipulação desses dispositivos, é correto afirmar que:

- (A) deve-se usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando as mesmas estiverem visivelmente sujas.
- (B) o uso de luvas substitui a necessidade de higiene das mãos.
- (C) a higienização das mãos deverá ocorrer somente após a remoção do cateter.
- (D) deve-se higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- (E) a higiene das mãos substitui a necessidade de luvas.

QUESTÃO 35

De acordo com a Anvisa (2017), o uso de cateter urinário é indicação para:

- (A) pacientes com micção espontânea.
- (B) paciente do sexo feminino com úlcera por pressão grau IV com cicatrização comprometida pelo contato pela urina.
- (C) gravidez de alto risco.
- (D) paciente com risco de queda.
- (E) paciente estável hemodinamicamente com necessidade de monitorização de débito urinário.

QUESTÃO 36

Segundo Lima e Matão (2010), como é denominado o estado patológico decorrente da incompatibilidade entre o fator Rh materno e o fetal, que acontece quando a mãe tem o fator Rh negativo e o feto Rh positivo?

- (A) Eritroblastose fetal.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Deficiência de Biotinidase.
- (D) Fenilcetonúria.
- (E) Icterícia.

QUESTÃO 37

De acordo com Silva (2021), que medicamento NÃO deve ser administrado quando o pulso do paciente apresentar frequência cardíaca (FC) menor que 60 bpm?

- (A) Dimeticona.
- (B) Hidrocortisona.
- (C) Digoxina.
- (D) Dimindrato.
- (E) Sinvastatina.

QUESTÃO 38

Paciente do sexo feminino, 55 anos, em pré-operatório de histerectomia, com queixa de disúria na manhã do dia da cirurgia. O técnico de enfermagem durante a realização dos sinais vitais constatou temperatura de 38°C, PA 110/60 mmHg, FC 100 bpm, FR 18 irpm. Com base nas informações apresentadas, o profissional deverá informar, imediatamente, a equipe de cirurgia sobre os sinais vitais diante da possibilidade de administração de:

- (A) um sedativo para ajudar a acalmar a paciente.
- (B) anti-hipertensivo e possibilidade de antecipação da cirurgia.
- (C) antitérmico e encaminhamento imediato para sala de cirurgia.
- (D) antitérmico e antecipação da cirurgia.
- (E) antitérmico e suspensão da cirurgia.

QUESTÃO 39

De acordo com Potter (2013), o cateterismo cardíaco é uma forma especializada de angiografia, na qual o cateter é inserido no lado esquerdo e/ou direito do coração via vaso sanguíneo periférico principal, usualmente a artéria e/ou veia femoral. Assim, um meio de contraste é injetado e as estruturas e funções do coração são avaliadas. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta sobre os cuidados imediatos ao paciente submetido ao cateterismo.

- (A) Promover o repouso de forma absoluta por uma hora.
- (B) Enfatizar ao paciente a necessidade de ficar deitado em decúbito ventral.
- (C) Restringir a ingestão ou administração venosa de líquidos por 8 horas.
- (D) Verificar pulsos pediosos e tibial posterior nos membros esquerdo e direito.
- (E) Estimular a deambular em até 2 horas.

QUESTÃO 40

De acordo com a Anvisa (2017), são medidas específicas recomendadas para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, EXCETO:

- (A) manter decúbito elevado (30-45°).
- (B) aspirar a secreção subglótica rotineiramente.
- (C) fazer higiene oral com antissépticos.
- (D) dar preferência por utilizar ventilação mecânica não-invasiva.
- (E) dar preferência a intubação nasotraqueal.

QUESTÃO 41

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 37 (2013), a hipertensão arterial (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Nesse contexto, preconiza-se a mudança do estilo de vida, fundamental no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Assim, assinale a opção que apresenta os fatores de risco para a HAS:

- (A) Dieta hipossódica, prática de exercício físico regular e aumento do peso corporal.
- (B) Redução do uso excessivo de álcool, Dieta hiperssódica e abandono do tabagismo.
- (C) Dieta hiperssódica, controle do peso e sedentarismo.
- (D) Dieta hiperssódica, aumento do peso corporal e sedentarismo.
- (E) Dieta hipossódica, controle do peso e sedentarismo.

QUESTÃO 42

De acordo com Lima e Matão (2010), como é denominada a infecção de pele causada por estafilococo ou estreptococo, podendo atingir qualquer parte da superfície cutânea, sendo na criança mais comum na face, principalmente próximo ao nariz ?

- (A) Impetigo.
- (B) Monilíase.
- (C) Pediculose.
- (D) Escabiose.
- (E) Hipospádia.

QUESTÃO 43

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), as insulinas disponíveis no Brasil têm concentração de:

- (A) 50 unidades/mL.
- (B) 60 unidades/mL.
- (C) 80 unidades/mL.
- (D) 100 unidades/mL.
- (E) 200 unidades/mL.

QUESTÃO 44

De acordo com American Heart Association (2020), assinale a opção cujo procedimento visa garantir a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar em adultos, na ausência de via aérea avançada.

- (A) Realizar compressão com força (pelo menos 2 cm) e rápido (80 a 100/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- (B) Estimular a interrupção nas compressões.
- (C) Alternar os responsáveis pelas compressões a cada 30 minutos.
- (D) Estimular a ventilação excessiva.
- (E) Manter relação compressão x ventilação de 30:2.

QUESTÃO 45

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32 (2012), o calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal. Sendo assim, o intervalo de agendamento da consulta de pré-natal de uma gestante que esteja com 30 semanas deverá ser:

- (A) semanal.
- (B) mensal.
- (C) quinzenal.
- (D) a cada 10 dias.
- (E) a cada 25 dias.

QUESTÃO 46

Um dos princípios fundamentais do código de ética dos profissionais de enfermagem prevê que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Sendo assim, assinale a opção correta no que diz respeito aos deveres do profissional de enfermagem.

- (A) Recusar-se a exercer atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e a coletividade.
- (B) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (C) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (D) Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- (E) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

QUESTÃO 47

De acordo com o Lima e Matão (2010), sobre terminologia cirúrgica, assinale a opção cujo prefixo corresponde a sua definição.

- (A) espleno = fígado.
- (B) cole = vesícula biliar.
- (C) blefaro = olho.
- (D) adeno = amígdala.
- (E) entero = baço.

QUESTÃO 48

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), o Diabetes Mellitus (DM) pode permanecer assintomático por longo tempo e sua detecção clínica é frequentemente realizada, não pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Assim, assinale a opção que apresenta os critérios para rastreamento do DM em adultos assintomáticos.

- (A) Excesso de peso, hipotensão arterial, e inatividade física.
- (B) Excesso de peso, síndrome de ovários policísticos, e dislipidemia.
- (C) Hipotrigliceridemia, síndrome de ovários policísticos, e inatividade física.
- (D) Hipotensão arterial, inatividade física e hipotrigliceridemia.
- (E) Dislipidemia, hipertensão arterial e excesso de peso.

QUESTÃO 49

Com base no guia de hemocomponente do Ministério da Saúde, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo sobre transfusão de hemocomponentes e assinale a opção correta.

- () Não existe contraindicação absoluta à transfusão em paciente com febre.
- () Os concentrados de hemácias podem ser transfundidos em acesso venoso compartilhado apenas com soro fisiológico 0,9%.
- () Todo o produto hemoterápico deve ser transfundido em equipo com filtro capaz de reter coágulos e agregados.
- () Pode ser adicionado droga ao produto hemoterápico a ser transfundido.
- () Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas.

- (A) (V) (V) (F) (V) (F)
- (B) (F) (F) (V) (V) (V)
- (C) (V) (V) (V) (F) (V)
- (D) (F) (V) (F) (V) (F)
- (E) (V) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 50

Segundo Potter (2013), assinale a opção que apresenta uma contraindicação ao uso de hidrogel.

- (A) ferida seca a moderada exsudação.
- (B) feridas superficiais.
- (C) queimadura de terceiro grau.
- (D) feridas com descolamentos.
- (E) feridas necróticas.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

