

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE
PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP/2022)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), a aplicação subcutânea da insulina pode ser realizada nos braços, abdômen, coxas e nádegas. Nesse contexto, a absorção ocorre em maior velocidade:

- (A) nos braços.
- (B) no abdômen.
- (C) nas coxas.
- (D) nas nádegas.
- (E) no antebraço.

QUESTÃO 2

De acordo com Potter (2017), as intervenções de enfermagem para pacientes que estão imóveis ou têm fatores de risco para lesão por pressão concentram-se na prevenção. Assim, das medidas básicas para prevenir lesões, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Deve-se realizar mudança de decúbito a cada 2 horas e, quando necessário, reposicionar o paciente no leito, usando o lençol de transferência.
- (B) Deve-se manter a pele seca e livre de maceração.
- (C) Após cada evacuação, deve-se limpar a área e proteger a pele com pomada de barreira contra umidade.
- (D) Para os pacientes com indicação, deve-se posicionar o paciente em um giro lateral de 30° e limitar a elevação da cabeceira a 30°.
- (E) Durante as mudanças de decúbito deve-se arrastar o paciente no leito, para evitar as lesões de cisalhamento e atrito.

QUESTÃO 3

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 37 (2013), a hipertensão arterial (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Nesse contexto, preconiza-se a mudança do estilo de vida, fundamental no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Assim, assinale a opção que apresenta os fatores de risco para a HAS:

- (A) Dieta hipossódica, prática de exercício físico regular e aumento do peso corporal.
- (B) Redução do uso excessivo de álcool, Dieta hiperssódica e abandono do tabagismo.
- (C) Dieta hiperssódica, controle do peso e sedentarismo.
- (D) Dieta hiperssódica, aumento do peso corporal e sedentarismo.
- (E) Dieta hipossódica, controle do peso e sedentarismo.

QUESTÃO 4

De acordo com Silva (2021), que medicamento NÃO deve ser administrado quando o pulso do paciente apresentar frequência cardíaca (FC) menor que 60 bpm?

- (A) Dimeticona.
- (B) Hidrocortisona.
- (C) Digoxina.
- (D) Dimindrato.
- (E) Sinvastatina.

QUESTÃO 5

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), o Diabetes Mellitus (DM) pode permanecer assintomático por longo tempo e sua detecção clínica é frequentemente realizada, não pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Assim, assinale a opção que apresenta os critérios para rastreamento do DM em adultos assintomáticos.

- (A) Excesso de peso, hipotensão arterial, e inatividade física.
- (B) Excesso de peso, síndrome de ovários policísticos, e dislipidemia.
- (C) Hipotrigliceridemia, síndrome de ovários policísticos, e inatividade física.
- (D) Hipotensão arterial, inatividade física e hipotrigliceridemia.
- (E) Dislipidemia, hipertensão arterial e excesso de peso.

QUESTÃO 6

Durante a passagem de plantão, o técnico de enfermagem informou os sinais vitais de cinco dos seus pacientes internados na enfermaria de um hospital. Analise as opções a seguir e assinale aquela que apresenta o paciente que deverá ser avaliado primeiro.

- (A) Idosa, 78, em pós-operatório de cirurgia no quadril, FR 14 irpm, PA 138x88 mmHg.
- (B) Idoso, 64 anos, internado com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral isquêmico, temperatura 37,4°C e FC 80 bpm.
- (C) Mulher, 55 anos, internada com diagnóstico de pneumonia, FR 28 irpm e SpO₂ 88%.
- (D) Homem, 75 anos, internado por úlceras venosas por diabetes, FC 82 bpm e temperatura 37,2°C.
- (E) Idoso, 85 anos, internado por infecção de trato de urinário e pneumonia, FR 16 irpm, PA 130x80 mmHg e SpO₂ 96%.

QUESTÃO 7

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34 (2013), como é denominada a alteração dos afetos, com perturbação do humor, onde se observam, pelo menos, 2 períodos que variam do excitado ao deprimido?

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Estresse pós-traumático.
- (C) Somatização.
- (D) Fobia.
- (E) Distúrbio bipolar.

QUESTÃO 8

Segundo Potter (2013), sobre os cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao procedimento de paracentese, analise as afirmativas e assinale a opção correta.

- I- monitorar sinais vitais, SpO₂ e a simetria dos movimentos da parede torácica.
- II- verificar a circunferência torácica.
- III- verificar peso.
- IV- inspecionar o curativo do local da punção para verificar sangramento, edema e eritema.
- V- avaliar nível de dor usando escala de 0 a 10, pois dor abdominal severa indica uma possível perfuração da bexiga.

- (A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 9

Para um determinado paciente foi prescrito a seguinte solução: soro fisiológico 0,9% 500 ml para ser infundido em 6 horas. Assim, de acordo com o Manual do técnico de enfermagem (2010), quantas gotas por minuto deverão ser infundidas nesse período?

- (A) 30
- (B) 29
- (C) 28
- (D) 26
- (E) 25

QUESTÃO 10

De acordo com a Anvisa (2017), são medidas específicas recomendadas para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, EXCETO:

- (A) manter decúbito elevado (30-45°).
- (B) aspirar a secreção subglótica rotineiramente.
- (C) fazer higiene oral com antissépticos.
- (D) dar preferência por utilizar ventilação mecânica não-invasiva.
- (E) dar preferência a intubação nasotraqueal.

QUESTÃO 11

Um médico prescreveu cetoprofeno 100 mg diluído em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para infundir em 20 minutos em um paciente com queixa de dor lombar. Com base nas informações apresentadas, calcule quantas gotas por minuto serão necessárias para administrar o medicamento e assinale a opção correta.

- (A) 50
- (B) 100
- (C) 120
- (D) 150
- (E) 200

QUESTÃO 12

Segundo Lima e Matão (2010), sobre a dequitação é correto afirmar que :

- (A) inicia com a dilatação completa, terminando com a expulsão do feto.
- (B) corresponde à primeira hora após a expulsão da placenta.
- (C) corresponde ao terceiro período do parto. Segue-se à expulsão do feto, indo até a expulsão completa da placenta e das membranas.
- (D) é considerado o primeiro período do parto, normalmente o mais longo deles.
- (E) corresponde à segunda hora após a expulsão da placenta.

QUESTÃO 13

De acordo com Potter (2017), com relação as precauções baseadas na transmissão (nível 2), utilizadas para tipos específicos de paciente, correlacione as categorias de precauções com o tipos de barreiras de proteção e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

CATEGORIAS DE PRECAUÇÕES

- I- Precaução ambiental (aerossóis) - relaciona-se às doenças que são transmitidas por gotículas menores, que permanecem no ar por longos períodos de tempo (ex. tuberculose pulmonar).
- II- Precaução de gotículas - concentra-se nas doenças que são transmitidas por gotículas grandes (ex. faringite estreptocócica).
- III- Precaução de contato - usada para contato direto e indireto com o paciente e o ambiente (ex. sarna).
- IV- Ambiente protetor - projetado para pacientes que tenham realizado transplante ou terapia genética. (ex. transplante de células troncos).

TIPOS DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO

- () Quarto privativo, máscara cirúrgica e higiene adequada das mãos.
 - () Quarto privativo com fluxo de ar positivo, máscara cirúrgica e higiene adequada das mãos.
 - () Quarto privativo, uso de luvas, capote e higiene adequada das mãos.
 - () Quarto privativo com fluxo de ar com pressão negativa, máscara de proteção respiratória N95 e higiene adequada das mãos.
- (A) (IV) (I) (II) (III)
(B) (II) (IV) (III) (I)
(C) (III) (II) (I) (IV)
(D) (II) (III) (IV) (I)
(E) (I) (IV) (III) (II)

QUESTÃO 14

Assinale a opção que representa os “quatro P’s”, como são conhecidos os sinais e sintomas característicos que levantam suspeita de Diabetes Mellitus.

- (A) Piúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
- (B) Piúria, palidez, polifagia e perda de memória.
- (C) Poliúria, palidez, prurido e perda de apetite.
- (D) Piúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
- (E) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.

QUESTÃO 15

Segundo Funasa (2001), como é denominada a complicação rara, grave e de difícil manejo em acidentes ofídicos, que decorre da compressão do feixe vaso-venoso consequente ao grande edema que se desenvolve no membro atingido, produzindo isquemia de extremidade, com dor intensa, parestesia, diminuição da temperatura distal, cianose e déficit motor?

- (A) Síndrome compartimental.
- (B) Abscesso.
- (C) Necrose.
- (D) Epistaxe.
- (E) Hemoptise.

QUESTÃO 16

No Brasil existem três gêneros de aranhas de importância médica: *Phoneutria*, *Loxosceles* e *Latrodectus*. Os acidentes causados por *Latrodectus* têm sido relatados na região Nordeste e ocorrem principalmente em pacientes do sexo masculino, na faixa etária de 10 a 30 anos (FUNASA,2001). Das manifestações sistêmicas decorrentes desses acidentes, podem ocorrer, dentre outras manifestações, a queda anormal da pálpebra superior sobre a pupila e a dilatação constante das pupilas. Essas manifestações são denominadas, respectivamente, de:

- (A) ectrópio e miose.
- (B) ptose e midríase.
- (C) ptose e miose.
- (D) miose e entrópio.
- (E) midríase e ptose.

QUESTÃO 17

De acordo com Potter (2013), com relação a administração de alimentação através de sonda nasoenteral (SNE) de pequeno calibre, assinale a opção correta.

- (A) A fórmula fria não provoca cólicas gástricas, pois o líquido é aquecido pela boca e pelo esôfago.
- (B) Não se deve administrar fórmula em temperatura ambiente, devido ao risco de provocar cólicas.
- (C) Não é necessário o uso de técnica asséptica para manipular os componentes do sistema de alimentação, como fórmula e conexões.
- (D) Deve-se manter a cabeceira a 0° durante a alimentação por SNE.
- (E) Deve-se verificar o volume residual gástrico antes de cada alimentação intermitente e a cada 4 a 6 horas para alimentações contínuas.

QUESTÃO 18

De acordo com Potter (2017), assinale a opção que apresenta o paciente com indicação do posicionamento em decúbito lateral esquerdo a 30 graus.

- (A) Hemiplégico à esquerda.
- (B) Com sinais de lesão por pressão estágio I em trocanter direito.
- (C) Com dispneia.
- (D) Com hipotensão.
- (E) Em pós-operatório de artroplastia de ombro esquerdo.

QUESTÃO 19

Segundo Lima e Matão (2010), como é denominado o estado patológico decorrente da incompatibilidade entre o fator Rh materno e o fetal, que acontece quando a mãe tem o fator Rh negativo e o feto Rh positivo?

- (A) Eritroblastose fetal.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Deficiência de Biotinidase.
- (D) Fenilcetonúria.
- (E) Icterícia.

QUESTÃO 20

Segundo Lima e Matão (2010), assinale a opção cujo o sufixo corresponde a definição correta.

- (A) ectomia = abertura.
- (B) stomia= reparo.
- (C) plastia= sutura.
- (D) tomia= retirada.
- (E) pexia= fixação.

QUESTÃO 21

De acordo com o Manual AIDPI Neonatal (2014), a administração de vitamina K deve ser realizada de forma rotineira no recém-nascido, a fim de evitar:

- (A) doença hemorrágica do recém-nascido.
- (B) icterícia neonatal.
- (C) infecção neonatal.
- (D) desnutrição.
- (E) deficiência da biotinidase.

QUESTÃO 22

Em decorrência da ação tóxica de alguns tipos de veneno offídico, a rabdomiólise é a manifestação clínica mais evidente da necrose da musculatura esquelética, liberando substâncias para o soro que posteriormente serão excretadas pela urina. Segundo o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), a essa excreção urinária denomina-se:

- (A) nictúria.
- (B) piúria.
- (C) hematúria.
- (D) glicosúria.
- (E) mioglobinúria.

QUESTÃO 23

Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), qual a via de administração da soroterapia antioffídica?

- (A) Intravenosa.
- (B) Subcutânea.
- (C) Intrapecal.
- (D) Intradérmica.
- (E) Oral.

QUESTÃO 24

De acordo com a Anvisa (2017), sobre a higiene das mãos antes e após a inserção de cateteres intravasculares e para qualquer tipo de manipulação desses dispositivos, é correto afirmar que:

- (A) deve-se usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando as mesmas estiverem visivelmente sujas.
- (B) o uso de luvas substitui a necessidade de higiene das mãos.
- (C) a higienização das mãos deverá ocorrer somente após a remoção do cateter.
- (D) deve-se higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais .
- (E) a higiene das mãos substitui a necessidade de luvas.

QUESTÃO 25

Os acidentes ofídicos têm importância em virtude de sua grande frequência e gravidade. Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), assinale a opção que NÃO apresenta primeiros socorros para esses acidentes:

- (A) Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão.
- (B) Manter o paciente deitado e hidratado.
- (C) Fazer torniquete ou garrote do membro afetado.
- (D) Se possível, levar o animal para identificação.
- (E) Procurar o serviço médico mais próximo.

QUESTÃO 26

De acordo com a regra de Nägele, qual será a data provável do parto de uma gestante, cuja data da última menstruação (DUM) foi em 20/6/2022 ?

- (A) 28/03/2023
- (B) 28/02/2023.
- (C) 27/01/2023.
- (D) 27/02/2023.
- (E) 27/03/2023..

QUESTÃO 27

De acordo com Potter (2013), com relação aos cuidados de enfermagem durante a realização de aspiração traqueal, assinale a opção correta:

- (A) no método de aspiração traqueal aberta, o cateter pode ser reutilizável por mais de uma sessão de aspiração.
- (B) na aspiração fechada envolve o uso de um cateter de aspiração estéril reutilizável.
- (C) recomenda-se instilação de 200 ml de soro fisiológico nas vias aéreas artificiais para melhorar a remoção de secreção.
- (D) girar o cateter durante a aspiração diminui a remoção das secreções aderidas nas vias aéreas.
- (E) na aspiração aberta são utilizadas luvas não estéreis, por se tratar de um procedimento contaminado.

QUESTÃO 28

Paciente do sexo feminino, 55 anos, em pré-operatório de histerectomia, com queixa de disúria na manhã do dia da cirurgia. O técnico de enfermagem durante a realização dos sinais vitais constatou temperatura de 38°C, PA 110/60 mmHg, FC 100 bpm, FR 18 irpm. Com base nas informações apresentadas, o profissional deverá informar, imediatamente, a equipe de cirurgia sobre os sinais vitais diante da possibilidade de administração de:

- (A) um sedativo para ajudar a acalmar a paciente.
- (B) anti-hipertensivo e possibilidade de antecipação da cirurgia.
- (C) antitérmico e encaminhamento imediato para sala de cirurgia.
- (D) antitérmico e antecipação da cirurgia.
- (E) antitérmico e suspensão da cirurgia.

QUESTÃO 29

De acordo com Silva (2021), assinale a opção que apresenta a correspondência correta entre a classificação e o medicamento.

- (A) Coagulante - enoxaparina sódica.
- (B) Antilipêmico - fenobarbital.
- (C) Anticoagulante - vitamina K.
- (D) Antitrombótico para infarto agudo do miocárdico - estreptoquinase.
- (E) Corticosteroide - tramadol.

QUESTÃO 30

Segundo Potter (2017), qual é o propósito do procedimento cirúrgico paliativo?

- (A) Confirmar o diagnóstico.
- (B) Realizar a remoção de parte do corpo.
- (C) Restaurar a função perdida ou reduzida como resultado de anomalias congênitas.
- (D) Aliviar ou reduzir a intensidade dos sintomas da doença.
- (E) Melhorar a aparência pessoal.

QUESTÃO 31

De acordo com Potter (2013), o cateterismo cardíaco é uma forma especializada de angiografia, na qual o cateter é inserido no lado esquerdo e/ou direito do coração via vaso sanguíneo periférico principal, usualmente a artéria e/ou veia femoral. Assim, um meio de contraste é injetado e as estruturas e funções do coração são avaliadas. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta sobre os cuidados imediatos ao paciente submetido ao cateterismo.

- (A) Promover o repouso de forma absoluta por uma hora.
- (B) Enfatizar ao paciente a necessidade de ficar deitado em decúbito ventral.
- (C) Restringir a ingesta ou administração venosa de líquidos por 8 horas.
- (D) Verificar pulsos pediosos e tibial posterior nos membros esquerdo e direito.
- (E) Estimular a deambular em até 2 horas.

QUESTÃO 32

Durante o exame clínico das mamas são desenvolvidas as etapas de inspeção e palpação a fim de detectar precocemente sugestivas alterações mamárias. Nesse procedimento, por meio da inspeção, pode ser observada a presença de :

- (A) nódulos.
- (B) secreção serosa.
- (C) linfonodos.
- (D) temperatura da pele.
- (E) assimetrias.

QUESTÃO 33

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento da Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Assim, assinale a opção que apresenta os hipoglicemiantes orais disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos (Rename) de 2012.

- (A) Metildopa, glibenclamida e gliclazida.
- (B) Hidroclorotiazida, glibenclamida e glicose hipertônica.
- (C) Cloridrato de metformina, glibenclamida e simvastatina.
- (D) Gliclazida, cloridrato de metformina e glibenclamida.
- (E) Hidroclorotiazida, cloridrato de metformina e gliclazida.

QUESTÃO 34

Carbonato de lítio, carbamazepina e ácido valpróico são fármacos voltados ao tratamento de transtornos mentais. Assinale a opção que apresenta a classe a que esses fármacos pertencem.

- (A) Estabilizadores de humor.
- (B) Antidepressivos.
- (C) Neurolépticos.
- (D) Benzodiazepínicos.
- (E) Antipsicóticos.

QUESTÃO 35

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), a insulina influencia o metabolismo da glicose na maioria dos tecidos. As insulinas mais comuns são as de ação rápida (regular) e as de ação intermediária (Neutral Proamine Hagedorn-NPH). Sobre a insulina regular é correto afirmar que:

- (A) é utilizada para o controle glicêmico basal.
- (B) pico de ação de 4 a 10 horas.
- (C) início da ação de 30 a 60 minutos.
- (D) recomenda-se dose noturna às 22h.
- (E) tem ação intermediária.

QUESTÃO 36

De acordo com Lima e Matão (2010), como é denominada a infecção de pele causada por estafilococo ou estreptococo, podendo atingir qualquer parte da superfície cutânea, sendo na criança mais comum na face, principalmente próximo ao nariz ?

- (A) Impetigo.
- (B) Monilíase.
- (C) Pediculose.
- (D) Escabiose.
- (E) Hipospádia.

QUESTÃO 37

A picada das formigas pode ser muito dolorosa e pode provocar complicações como anafilaxia, necrose e infecções secundárias. Conforme o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos (FUNASA,2001), assinale a opção que apresenta o tipo de compressa a ser utilizada no tratamento imediato dessa picada:

- (A) compressas frias.
- (B) compressas mornas.
- (C) compressas quentes.
- (D) compressa emoliente.
- (E) compressa seca.

QUESTÃO 38

Segundo Potter (2013), assinale a opção que apresenta uma contraindicação ao uso de hidrogel:

- (A) ferida seca a moderada exsudação.
- (B) feridas superficiais.
- (C) queimadura de terceiro grau.
- (D) feridas com descolamentos.
- (E) feridas necróticas.

QUESTÃO 39

Um dos princípios fundamentais do código de ética dos profissionais de enfermagem prevê que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Sendo assim, assinale a opção correta no que diz respeito aos deveres do profissional de enfermagem.

- (A) Recusar-se a exercer atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (B) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (C) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (D) Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- (E) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

QUESTÃO 40

Com base no guia de hemocomponente do Ministério da Saúde, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo sobre transfusão de hemocomponentes e assinale a opção correta.

- () Não existe contraindicação absoluta à transfusão em paciente com febre.
 - () Os concentrados de hemácias podem ser transfundidos em acesso venoso compartilhado apenas com soro fisiológico 0,9%.
 - () Todo o produto hemoterápico deve ser transfundido em equipo com filtro capaz de reter coágulos e agregados.
 - () Pode ser adicionado droga ao produto hemoterápico a ser transfundido.
 - () Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas.
-
- (A) (V) (V) (F) (V) (F)
 - (B) (F) (F) (V) (V) (V)
 - (C) (V) (V) (V) (F) (V)
 - (D) (F) (V) (F) (V) (F)
 - (E) (V) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 41

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 34 (2013), como são denominadas as escutas irreais, em terceira pessoa, que comentam atos de pessoas, geralmente muito assustadores e com pouca relação com os acontecimentos recentes?

- (A) Ilusões.
- (B) Alucinações.
- (C) Transgressão.
- (D) Vertigem.
- (E) Angústia.

QUESTÃO 42

De acordo com American Heart Association (2020), assinale a opção cujo procedimento visa garantir a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar em adultos, na ausência de via aérea avançada.

- (A) Realizar compressão com força (pelo menos 2 cm) e rápido (80 a 100/min) e aguardar o retorno total do tórax.
- (B) Estimular a interrupção nas compressões.
- (C) Alternar os responsáveis pelas compressões a cada 30 minutos.
- (D) Estimular a ventilação excessiva.
- (E) Manter relação compressão x ventilação de 30:2.

QUESTÃO 43

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32 (2012), o calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal. Sendo assim, o intervalo de agendamento da consulta de pré-natal de uma gestante que esteja com 30 semanas deverá ser:

- (A) semanal.
- (B) mensal.
- (C) quinzenal.
- (D) a cada 10 dias.
- (E) a cada 25 dias.

QUESTÃO 44

De acordo com a Anvisa (2017), o uso de cateter urinário é indicação para:

- (A) pacientes com micção espontânea.
- (B) paciente do sexo feminino com úlcera por pressão grau IV com cicatrização comprometida pelo contato pela urina.
- (C) gravidez de alto risco.
- (D) paciente com risco de queda.
- (E) paciente estável hemodinamicamente com necessidade de monitorização de débito urinário.

QUESTÃO 45

De acordo com a Anvisa (2017), sobre a seleção do cateter intravascular periférico e sítio de inserção, é correto afirmar que:

- (A) deve-se selecionar, prioritariamente, o cateter periférico com base nas condições de acesso venoso.
- (B) deve-se utilizar cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes e nutrição parenteral.
- (C) os cateteres com menor calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
- (D) caso o adulto não caminhe, deve-se considerar as veias dos pés.
- (E) deve-se preferir a região de flexão.

QUESTÃO 46

De acordo com o Lima e Matão (2010), sobre terminologia cirúrgica, assinale a opção cujo prefixo corresponde a sua definição.

- (A) espleno = fígado.
- (B) cole= vesícula biliar.
- (C) blefaro = olho.
- (D) adeno= amigdala.
- (E) entero= baço.

QUESTÃO 47

Com base na classificação das lesões por pressão, Analise as seguintes características: perda da espessura total do tecido; gordura subcutânea visível; osso, tendão e músculos não expostos; presença de esfacelo, mas sem obscurecer a profundidade da perda tecidual. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta a categoria / estágio supracitada.

- (A) Não estadiável/ não classificada.
- (B) Categoria / estágio I.
- (C) Categoria / estágio IV.
- (D) Categoria / estágio III.
- (E) Categoria / estágio II.

QUESTÃO 48

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 36 (2013), as insulinas disponíveis no Brasil têm concentração de:

- (A) 50 unidades/mL.
- (B) 60 unidades/mL.
- (C) 80 unidades/mL.
- (D) 100 unidades/mL.
- (E) 200 unidades/mL.

QUESTÃO 49

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 23 (2015), dos sinais indicativos da técnica de amamentação, assinale a opção que apresenta um sinal INADEQUADO:

- (A) boca bem aberta.
- (B) lábio inferior virado para fora.
- (C) queixo tocando a mama.
- (D) bebê com cabeça e tronco alinhados.
- (E) ruídos na língua.

QUESTÃO 50

Segundo Lima e Matão (2010), assinale a opção correta sobre a criptorquidia:

- (A) Excesso de líquor dentro da cavidade intracraniana e no consequente aumento do tamanho da cabeça.
- (B) Ausência de um ou ambos os testículos na bolsa escrotal.
- (C) Malformação da coluna, na qual ocorre uma abertura devido ao não fechamento da parte posterior das lâminas vertebrais.
- (D) Obstrução do esôfago, impedindo o trânsito livre e contínuo da faringe até o estômago.
- (E) Posição anormal da abertura da uretra.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
 - 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
 - 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
 - 4 - A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
 - 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
 - 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
 - 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
 - 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
 - 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **2 (duas) horas**.
 - 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
 - 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, sobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá;
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
 - 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50