

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2012.2)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

- 1) Em relação à proteção radiológica, assinale a opção que apresenta exclusivamente medidas recomendadas para proteção do paciente segundo De Freitas et al. (2004).
- (A) Calibração do aparelho, colimação e proteção às gônadas.
 - (B) Colimação, filtração e câmaras de ionização.
 - (C) Proteção às gônadas e uso de biombo com vidro plumbífero.
 - (D) Calibração do aparelho e uso de dosímetro.
 - (E) Distância mínima de 1,8m do aparelho, colimação e proteção às gônadas.
- 2) Perante a Lei 11.889/08, qual é a atividade que o Técnico em Saúde Bucal pode realizar sem a supervisão direta do Cirurgião-Dentista?
- (A) Participar de ações educativas, atuando na promoção da saúde.
 - (B) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.
 - (C) Remover suturas.
 - (D) Fazer a remoção do biofilme.
 - (E) Realizar o isolamento do campo operatório.
- 3) Assinale a opção que apresenta as características anatômicas do primeiro molar inferior permanente.
- (A) Mostra três cúspides vestibulares.
 - (B) É tetracuspídeo.
 - (C) Apresenta duas raízes, uma vestibular e outra palatina.
 - (D) É menor em tamanho e volume que o segundo molar inferior.
 - (E) Apresenta uma cúspide a menos que o segundo molar inferior.
- 4) Assinale a opção que descreve corretamente o arco de Ostby utilizado na realização do isolamento absoluto para um procedimento endodôntico no consultório odontológico.
- (A) Em forma de U e metálico.
 - (B) De forma quadrada, com uma dobradiça no meio.
 - (C) Em forma de U e em náilon.
 - (D) Em forma de U, com uma dobradiça no meio.
 - (E) De forma octogonal, em plástico.

- 5) Considerando o preparo da bandeja para tratamento endodôntico, qual solução irrigadora NÃO deverá estar na bandeja para a irrigação e aspiração dos canais radiculares?
- (A) Hipoclorito de sódio.
 - (B) Ácido ortofosfórico.
 - (C) Edta.
 - (D) Solução aquosa de hidróxido de cálcio.
 - (E) Clorexidina.
- 6) São tomadas radiográficas intrabucais, EXCETO:
- (A) Periapical - técnica da Bissetriz (CIESZYNSKY).
 - (B) Periapical - técnica do Paralelismo.
 - (C) Panorâmica.
 - (D) Interproximal (BITE-WING).
 - (E) Oclusal.
- 7) Tem como função manter e estabilizar o lençol de borracha no colo do dente e é formado por um arco que une as duas garras. É encontrado com números e tamanhos diversos de acordo com a anatomia do dente em que será utilizado.

Segundo Lopes & Siqueira (2010), o trecho acima apresenta a descrição de

- (A) pinça perfuradora.
 - (B) pinça de Brewer.
 - (C) grampo.
 - (D) pinça porta-grampo.
 - (E) arco de Young.
- 8) De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é correto afirmar que
- (A) é indicado somente no atendimento ao paciente.
 - (B) sua utilização não é obrigatória, ficando a critério do profissional da equipe odontológica quando utilizá-lo.
 - (C) é destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
 - (D) o tipo de EPI indicado independe do risco da atividade.
 - (E) sua aquisição, sua substituição, quando danificados ou extraviados, e sua orientação quanto ao uso são de responsabilidade individual do profissional da equipe odontológica e não do responsável técnico da equipe.

- 9) De acordo com a Lei 11.889/08, compete ao Auxiliar de Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal:
- (A) exercer a atividade de forma autônoma.
 - (B) executar moldagens intrabucais.
 - (C) preparar modelos em gesso.
 - (D) fazer a remoção do biofilme.
 - (E) realizar suturas.
- 10) Segundo Baratieri et al. (2010), "Para a obtenção de bons moldes com a técnica de tempo único, é imprescindível trabalhar a quatro mãos". Sendo assim, o auxiliar deve
- (A) realizar a fotopolimerização do material de moldagem.
 - (B) iniciar a mistura manual do material de alta viscosidade.
 - (C) preencher toda a extensão da moldeira com material de baixa viscosidade.
 - (D) realizar vedação com godiva no molde após retirá-lo da boca.
 - (E) realizar placa de mordida para registrar o molde.
- 11) O controle químico da placa bacteriana deve ser realizado, em casos selecionados, como coadjuvante do controle mecânico. Em relação aos agentes utilizados para o controle químico da placa bacteriana, assinale a opção correta.
- (A) Os óleos essenciais são potentes antioxidantes e permanecem ativos e aderidos à superfície dos dentes de 10 a 12 horas.
 - (B) O cloreto de cetilpiridíneo é do grupo de bisbiguanidas sem carga e apresenta baixa substantividade.
 - (C) O digluconato de clorexidina apresenta baixa estabilidade e sua ação antioxidante altera a microbiota bucal.
 - (D) O triclosan tem ação antimicrobiana e se apresenta associado a outros produtos na composição de dentifrícios.
 - (E) O peróxido de hidrogênio é um importante antifúngico do grupo dos compostos fenólicos.

- 12) A articulação temporomandibular auxilia no movimento da mandíbula e é composta por diversas estruturas, dentre elas:
- (A) o osso zigomático.
 - (B) o músculo orbicular.
 - (C) a fossa incisiva.
 - (D) o ângulo da mandíbula.
 - (E) o côndilo.
- 13) Considerando os cuidados na escolha de produtos para a higienização das mãos na prática odontológica, os princípios ativos listados abaixo são aceitos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) para antissepsia das mãos, EXCETO:
- (A) álcool a 70%.
 - (B) clorexidina.
 - (C) Polivinil Pirrolidona Iodo (PVPI).
 - (D) compostos de iodo.
 - (E) álcool a 96%.

14) Segundo Pinto (2008), a estratégia populacional de prevenção é apropriada para lidar com problemas como a cárie e as doenças periodontais. Tendo em vista essa estratégia, coloque (V) Verdadeiro e ou (F) Falso nas afirmativas abaixo, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- () Os fatores de risco ambientais relacionados com as doenças bucais, como o consumo exagerado de açúcar e a má higiene bucal, podem variar de acordo com comportamentos individuais.
- () O flúor exerce um papel de proteção contra a cárie, mas tem custo elevado para ser colocado à disposição de todos os indivíduos ou da maioria deles.
- () A higiene bucal diária adequada é fator decisivo na prevenção e no tratamento da maioria das doenças periodontais.
- () Modificações no comportamento das pessoas não trazem benefícios na redução da ocorrência de cárie e da doença periodontal.
- () A erradicação completa da placa bacteriana dental e do consumo de açúcar não é apenas irrealista como também desnecessária.

- (A) (F) (V) (F) (F) (V)
- (B) (V) (F) (V) (V) (V)
- (C) (F) (V) (F) (V) (F)
- (D) (V) (F) (V) (F) (V)
- (E) (V) (F) (F) (V) (F)

15) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

Segundo Lopes & Siqueira (2010), a dentina constitui o tecido mineralizado que forma o maior volume do dente. A porção _____ é recoberta por uma camada de _____ e a região _____ é revestida _____. Interiormente, a dentina delimita uma cavidade que contém _____.

- (A) radicular / esmalte / coronária / pelo cimento / a polpa dentária
- (B) da polpa dentária / cimento / radicular / pelo esmalte / o osso
- (C) radicular / cimento / coronária / pelo osso / a polpa dentária
- (D) coronária / esmalte / radicular / pelo cimento / a polpa dentária
- (E) coronária / esmalte / radicular / pela polpa dentária / o osso

- 16) Em relação às soluções para o processamento radiográfico, assinale a opção correta.
- (A) O revelador é uma solução química que atua preferencialmente nos sais de prata metálica que foram sensibilizados aos raios X.
 - (B) Elon e hidroquinona são os agentes redutores componentes do fixador.
 - (C) O sulfito de sódio é o agente antioxidante que está presente apenas no revelador.
 - (D) A ação do líquido fixador é dissolver os sais de prata que foram expostos aos raios X.
 - (E) Com a degradação da solução de processamento, a mudança de cor é uma característica evidente, sendo que o líquido se torna incolor quando começa a se deteriorar.
- 17) Em relação ao tratamento de cavitações de cárie com restaurações atraumáticas, é correto afirmar que
- (A) deve ser realizado sob sedação do paciente, evitando, assim, a contenção física.
 - (B) o material de escolha é o selante de fissuras por sua alta viscosidade.
 - (C) pode ser realizado em bebês com cárie de rápida progressão.
 - (D) a remoção do tecido cariado é realizada com brocas de Gates.
 - (E) é o tratamento preconizado para dentes com comprometimento pulpar.
- 18) Após realizar uma restauração, muitas vezes, o Cirurgião-Dentista precisa realizar a marcação e a avaliação dos contatos oclusais. Para isso, utiliza papel articular e
- (A) Pinça de Miller.
 - (B) Lima de Kerr.
 - (C) Arco de Young.
 - (D) Sonda Milimetrada.
 - (E) Pinça de Schlugger.

- 19) Os materiais de proteção individual são essenciais na prática odontológica. Dentre os exemplos abaixo, qual poderá receber desinfecção com álcool para ser reutilizado?
- (A) Luva de procedimento.
 - (B) Gorro.
 - (C) Avental.
 - (D) Pró-pés.
 - (E) Óculos de proteção.
- 20) Durante a extensão proximal dos preparos de dentes para a confecção de INLAYS cerâmicos, faz-se necessário incluir na bandeja material para a proteção dos dentes adjacentes. Como se denomina esse material?
- (A) Lençol de Borracha.
 - (B) Fio Retrator.
 - (C) Matriz Metálica.
 - (D) Lixa Interproximal.
 - (E) Afastador de Minnessota.
- 21) Os instrumentos para preparo dos canais radiculares são padronizados quanto a diversos itens, dentre eles: numeração e cor de cabo. Os cabos plásticos coloridos das limas endodônticas facilitam a identificação dessas limas de acordo com os diâmetros. Sendo assim, é correto afirmar que as limas de números 10 e 35 correspondem, respectivamente, aos cabos anatômicos de cores:
- (A) roxa; verde.
 - (B) rosa; azul.
 - (C) roxa; azul.
 - (D) branca; verde.
 - (E) verde; azul.

- 22) A prevenção da Síndrome do Alvéolo Seco (ou Osteíte Alveolar) requer a aplicação de medidas que minimizem o trauma e a contaminação no local da cirurgia. Assinale a opção que exemplifica uma das medidas que produz esses efeitos.
- (A) Utilizar substâncias hemostáticas no alvéolo.
 - (B) Orientar paciente a utilizar compressas mornas na face no pós-operatório, a fim de aumentar a vascularização local.
 - (C) Fazer irrigação da ferida, após procedimento cirúrgico, com grandes quantidades de soro, aplicado sob pressão.
 - (D) Fazer suturas com tensão no alvéolo.
 - (E) Orientar o paciente a iniciar a higiene oral somente no 3º dia pós-operatório.
- 23) O ponto de contato interdental que se forma entre as faces mesiais de dentes contíguos está relacionado aos elementos dentais:
- (A) 17 e 18
 - (B) 31 e 41
 - (C) 55 e 16
 - (D) 61 e 62
 - (E) 84 e 85
- 24) Em relação aos efeitos biológicos dos raios X, as células podem ser classificadas, de acordo com sua radiosensibilidade, em radiosensíveis, radiorreativas ou radiorresistentes. Assinale a opção que apresenta células radiosensíveis.
- (A) Células do epitélio da pele.
 - (B) Células das glândulas salivares.
 - (C) Células dos rins e do fígado.
 - (D) Células do tecido hematopoiético.
 - (E) Células nervosas (incluindo o cérebro).

- 25) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

Ao posicionar o filme durante o exame radiográfico, deve-se ter o cuidado de colocá-lo corretamente, obedecendo a alguns requisitos. Para radiografar os dentes _____, o longo eixo do filme deverá ser _____ ao plano _____.

- (A) molares / perpendicular / horizontal
 - (B) pré-molares / paralelo / horizontal
 - (C) caninos / perpendicular / sagital mediano
 - (D) incisivos / paralelo / horizontal
 - (E) caninos ou incisivos / paralelo / horizontal
- 26) De acordo com De Freitas et al. (2004), para cada grupamento de dentes, a área de incidência obedece a uma determinada localização. Qual é o grupo de dentes em que o feixe central de raios X incide na área da interseção formada pela linha imaginária, determinada a partir do centro da pupila do paciente, perpendicular àquela localizada a 0,5 cm acima da base da mandíbula?
- (A) Pré-molares.
 - (B) Molares.
 - (C) Caninos.
 - (D) Pré-molares e caninos.
 - (E) Incisivos.
- 27) Segundo a classificação de riscos do Ministério da Saúde (Brasil, 2006), Assinale a opção que apresenta um procedimento que minimiza o Risco Físico a que estão submetidos os profissionais de Odontologia.
- (A) Limpar sujeira do chão.
 - (B) Usar Equipamento de Proteção Individual somente em pacientes sabidamente soropositivos para HIV.
 - (C) Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos.
 - (D) Manter ambiente de trabalho com iluminação eficiente.
 - (E) Instalar extintores de incêndio e capacitar a equipe para a sua utilização.

- 28) Assinale a opção correta em relação às técnicas radiográficas intrabucais de acordo com De Freitas et al. (2004).
- (A) Quando a técnica periapical da bissetriz for empregada, deve-se orientar o feixe de raios X perpendicularmente ao plano bissetor formado pelo plano do dente e do filme.
 - (B) O ângulo vertical é obtido movimentando-se o cilindro dos aparelhos de raios X em relação ao Plano Sagital Mediano.
 - (C) Por convenção, no exame da mandíbula, têm-se ângulos verticais positivos, e, no exame da maxila, têm-se ângulos verticais negativos.
 - (D) Os ângulos de incidência do feixe de raios X são determinados posicionando-se o feixe em relação à Linha de Oclusão e ao Plano Axial.
 - (E) O correto posicionamento da cabeça do paciente não tem importância para se obter uma padronização no tocante às técnicas radiográficas.
- 29) Dentre as estratégias adotadas para controle das doenças periodontais, a que produz efeitos dominantes e é recomendada com ênfase pela Organização Mundial de Saúde é denominada de estratégia de
- (A) base populacional.
 - (B) atenção precoce.
 - (C) atenção ao alto risco.
 - (D) risco calculado.
 - (E) risco amplificado.
- 30) A dentição decídua apresenta diferenças em relação à dentição permanente. Dentre elas, é correto afirmar que
- (A) a dentição decídua é composta de 24 dentes e a dentição permanente é composta de 32 dentes.
 - (B) a dentição permanente apresenta o diastema primata, que só é fechado após a erupção dos terceiros molares.
 - (C) os primeiros molares decíduos irrompem em torno dos 6 anos de idade.
 - (D) a dentição decídua não apresenta o grupamento de dentes pré-molares.
 - (E) os dentes caninos permanentes irrompem em torno dos 7 anos de idade.

- 31) O Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) apresenta como características sua praticidade e rápida execução. Esse índice atua na mensuração
- (A) das condições de saúde dos tecidos gengivais.
 - (B) das condições de saúde dos tecidos gengivais e do periodonto.
 - (C) da presença de placa e tártaro na superfície de dentes específicos.
 - (D) do grau de comprometimento periodontal, adotando a divisão por sextantes.
 - (E) da presença de dentes ausentes, cariados e obturados.
- 32) Assinale a opção que apresenta uma das medidas que deve ser aplicada no paciente para controle do sangramento primário após extrações dentárias.
- (A) Mantê-lo completamente deitado até que cesse o sangramento.
 - (B) Orientá-lo a aplicar compressas mornas na face, na região correspondente à do dente extraído.
 - (C) Orientá-lo a cuspir a saliva com sangue até que a mesma saia livre de sangue.
 - (D) Manter compressa de gaze no interior do alvéolo até a data da remoção de sutura.
 - (E) Instruí-lo a morder compressa de gaze diretamente no local previamente ocupado pela coroa do dente extraído.
- 33) Segundo as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) para a conduta após exposição a material biológico, é correto afirmar que:
- (A) deve-se aplicar injeção de antissépticos no local.
 - (B) deve-se iniciar quimioprofilaxia para Hepatite B e HIV em todas as situações.
 - (C) se, durante o acompanhamento, ocorrer novo acidente com o funcionário, ele deverá submeter-se a todo o protocolo novamente, desconsiderando todos os procedimentos já realizados.
 - (D) após o acidente com material biológico ocorrido com o profissional da equipe odontológica, o paciente deverá ser imediatamente dispensado do consultório ou clínica odontológica.
 - (E) o exame sorológico para HIV poderá ser exigido do paciente sem que ele possa recusar-se a fazê-lo.

- 34) Para a cimentação adesiva de coroas estéticas, é utilizado o seguinte material:
- (A) cimento fosfato de zinco.
 - (B) cimento de ionômero de vidro.
 - (C) cimento cirúrgico.
 - (D) cimento de cromocobalto.
 - (E) cimento de hidróxido de cálcio.
- 35) Assinale a opção correta em relação às técnicas radiográficas do Paralelismo e da Bissetriz de acordo com De Freitas et al. (2004).
- (A) A técnica da Bissetriz não exige o correto posicionamento da cabeça do paciente.
 - (B) A técnica do Paralelismo impossibilita a padronização, não permitindo obter radiografias iguais em épocas diferentes.
 - (C) A distância focal, na técnica do Paralelismo, é de 20cm, enquanto que, na técnica da Bissetriz, é de 40cm.
 - (D) Na técnica da Bissetriz, a determinação dos ângulos verticais e horizontais se dá pelo posicionamento do suporte porta-filmes.
 - (E) A técnica do Paralelismo tem como vantagem, em relação à da Bissetriz, o fato de permitir menor grau de ampliação da imagem radiográfica.
- 36) A cavidade oral pode ser sede de diversos distúrbios, e a resposta que o organismo oferece a cada um deles é diferente. Assinale a opção que apresenta uma neoplasia maligna da cavidade bucal.
- (A) Herpes Simples.
 - (B) Alveolite.
 - (C) Papiloma.
 - (D) Fibroma.
 - (E) Carcinoma Epidermoide.

- 37) De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), a antissepsia cirúrgica das mãos deverá atender aos seguintes requisitos:
- (A) utilizar antisséptico alcoólico que dispensa enxágue fazendo fricção nas mãos, e secar com papel toalha.
 - (B) utilizar sabonetes sólidos em pedaços pequenos e secar com toalha de uso múltiplo.
 - (C) antes de iniciar a higienização, pulseiras, anéis e relógios deverão ser removidos, com exceção da aliança, que poderá ser removida ou não, a critério do profissional.
 - (D) utilizar movimentos de fricção iniciando na região do antebraço e seguir em direção aos dedos.
 - (E) enxaguar as mãos em água corrente, deixando escorrer das pontas dos dedos para o antebraço, até eliminar completamente o produto.
- 38) Segundo Cantisano (1987), qual é, respectivamente, o número de cúspides do primeiro e do segundo pré-molares inferiores?
- (A) Duas e duas.
 - (B) Duas e três.
 - (C) Três e duas.
 - (D) Uma e três.
 - (E) Três e três.
- 39) De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), para o processamento do filme radiográfico odontológico, os seguintes procedimentos devem ser observados, EXCETO:
- (A) as soluções de processamento devem ser trocadas quando necessário, de acordo com as instruções do fabricante.
 - (B) filmes ou soluções de processamento com prazo de validade já expirado podem ser utilizados, desde que seja aumentado o tempo de exposição ao Raio-X.
 - (C) a câmara escura e as cubas de revelação devem ser mantidas limpas.
 - (D) os filmes radiográficos devem ser armazenados em local protegido do calor, e da umidade.
 - (E) os filmes radiográficos devem ser armazenados em local protegido da radiação e de vapores químicos.

- 40) O conjunto: matriz, cunha e anel metálico, é utilizado para
- (A) tracionamento de dentes anteriores.
 - (B) realização da técnica da dupla moldagem.
 - (C) preparo e restauração classe II.
 - (D) colagem de braquetes em pré-molares.
 - (E) afastamento proximal de dentes para a instalação de bandas ortodônticas.
- 41) Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o risco de transmissão ocupacional do HIV para o trabalhador de saúde, após exposição percutânea e mucocutânea, é estimado, respectivamente, em:
- (A) 0,009% e 0,3%
 - (B) 0,03% e 9%
 - (C) 0,3% e 0,09%
 - (D) 0,9% e 30%
 - (E) 3% e 9%
- 42) O método de processamento radiográfico que consiste em colocar o filme na solução reveladora, e de tempos em tempos, examinar o aparecimento da imagem e o grau de densidade dessa imagem contra a luz de segurança é denominado de processamento
- (A) manual pelo método temperatura/tempo.
 - (B) automático.
 - (C) especial.
 - (D) manual pelo método inspeccional.
 - (E) manual monobanho.
- 43) Em diversos casos, as cirurgias periodontais ou áreas cirúrgicas são cobertas por cimento cirúrgico para protegê-las das injúrias durante a cicatrização. Para tal, o cimento cirúrgico deve:
- (A) ter consistência fluida para melhor adaptação.
 - (B) cobrir o terço cervical dos dentes adjacentes à cirurgia.
 - (C) apresentar rugosidade em suas bordas e superfícies.
 - (D) conservar espessura e degrau mínimos de 10mm.
 - (E) ser aplicado sobre a área cirúrgica com pincel fino.

- 44) Segundo Lobas (2008), a desinfecção dos moldes visa impedir a contaminação cruzada. Para a desinfecção de moldes de material hidrocoloide irreversível, deve-se proceder da seguinte forma:
- (A) SPRAY com iodopovidona 5%; lavagem em água corrente; imersão em glutaraldeído 2% por 5 min e secagem do molde.
 - (B) SPRAY com clorexidina 2%; colocação em umidificador com álcool 70% por 10 min; lavagem em água corrente e secagem do molde.
 - (C) SPRAY com clorexidina 2%; imersão em glutaraldeído 5% por 10 min e secagem do molde.
 - (D) SPRAY com hipoclorito de sódio 1%; colocação em umidificador com solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 min; lavagem em água corrente e secagem do molde.
 - (E) SPRAY com álcool 70%; lavagem em água corrente; imersão em iodopovidona 2% por 5 min e secagem do molde.
- 45) Na prática odontológica, é comum a manipulação de sangue e de outros fluidos orgânicos, que são as principais vias de transmissão do HIV e dos vírus das Hepatites B (HBV) e C (HCV). Assinale a opção que apresenta o procedimento para diminuir o risco de transmissão por sangue e outros fluidos orgânicos de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).
- (A) Entortar ou quebrar as agulhas das seringas.
 - (B) Colocar coletores específicos para materiais perfurocortantes afastados do local em que é realizado o procedimento.
 - (C) Não utilizar dedos como anteparos durante a realização de procedimentos que envolvem materiais perfurocortantes.
 - (D) Usar somente óculos e luvas como Equipamento de Proteção Individual.
 - (E) Remover agulhas das seringas com as mãos.
- 46) Assinale a opção que apresenta exemplo de resíduo químico.
- (A) Pontas diamantadas.
 - (B) Radiografias odontológicas.
 - (C) Órgãos e tecidos.
 - (D) Materiais contendo líquidos corpóreos na forma livre.
 - (E) Limas endodônticas.

- 47) Dentre os equipamentos e instrumentos rotatórios e alternativos abaixo, qual, em virtude de seu formato, é de uso extraoral segundo Baratieri et. al. (2010)?
- (A) Contra-ângulo de baixa rotação.
 - (B) Ablação a laser.
 - (C) Pontas ultrassônicas.
 - (D) Contra-ângulo de baixo torque.
 - (E) Peça reta.
- 48) Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), em virtude de sua maior exposição, os profissionais da equipe odontológica possuem risco aumentado para ocorrência de doenças infecto-contagiosas. Para minimizar esse risco, esses profissionais deverão ser devidamente imunizados contra Hepatite B, entre outras vacinas. A respeito do esquema vacinal da Hepatite B, é INCORRETO afirmar que:
- (A) é realizado em três doses.
 - (B) recomenda-se realizar testes sorológicos dois meses após o término do esquema vacinal completo.
 - (C) os indivíduos que não responderem ao esquema vacinal devem fazer uma dose de reforço.
 - (D) as vacinas devem ser realizadas, preferencialmente, em serviços públicos ou em rede credenciada.
 - (E) testes sorológicos são recomendados para a avaliação da manutenção da imunização.
- 49) A saliva banha dentes e mucosa formando um delgado filme. Assinale a opção que apresenta uma das funções protetoras da saliva.
- (A) Possui efeito tampão que desmineraliza a superfície dentária.
 - (B) Acumula carboidratos derivados de alimentação.
 - (C) Reduz a eliminação de micro-organismos da cavidade bucal.
 - (D) Seus componentes ácidos têm ação protetora sobre o esmalte.
 - (E) Aumenta a resistência da hidroxiapatita através de seus componentes inorgânicos.

- 50) Correlacione os nomes dos acidentes anatômicos de dentes humanos às suas respectivas definições e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

ACIDENTES ANATÔMICOS
DOS DENTES

DEFINIÇÕES

- | | |
|--------------|---|
| I - Aresta | () superfície côncavo-depressiva, limitada por contornos circulares, ovulares ou triangulares, presente na face lingual de incisivos e caninos e na face oclusal de pré-molares e molares. |
| II - Borda | () projeção linear de uma face. |
| III- Cúspide | () intersecção de duas faces. |
| IV - Fossa | () acidente da face oclusal de pré-molares e molares, forma piramidal de base quadrangular em que se destacam quatro planos inclinados ou facetas e um vértice. |

- (A) (IV) (II) (I) (III)
(B) (III) (II) (I) (IV)
(C) (IV) (I) (III) (II)
(D) (IV) (III) (I) (II)
(E) (II) (III) (I) (IV)

