

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2013)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 1) Sabendo-se que a hipertensão é uma doença da regulação vascular, na qual estão alterados os mecanismos que controlam a pressão arterial dentro da faixa de normalidade, assinale a opção que apresenta consequências da hipertensão.
- (A) Lesiona os vasos sanguíneos no cérebro, olhos, coração e rins.
 - (B) Compromete os membros inferiores, olhos, coração e rins.
 - (C) Lesiona os olhos, coração e pulmão.
 - (D) Lesiona os vasos linfáticos, olhos, coração e pâncreas.
 - (E) lesiona os pulmões, coração e aparelho digestivo.
- 2) De acordo com as normas legais referentes ao transplante e à remoção de órgãos e tecidos no Brasil, é correto afirmar que
- (A) as equipes cirúrgicas necessitam de consentimento expresso da família, pois remoções sem o consentimento podem acarretar sérios problemas legais.
 - (B) a legislação brasileira admite a doação presumida de órgãos e tecidos, sendo assim, para que o indivíduo não seja considerado doador, faz-se necessário registrar a expressão "não doador de órgãos e tecidos" na carteira de identidade civil.
 - (C) o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas no prazo de 48 horas poderá ser destinado à retirada de órgãos.
 - (D) no Brasil, não se admite remoções e transplantes de órgãos ou tecidos.
 - (E) nos transplantes a partir de doadores cadáveres não se deve discutir os critérios empregados na comprovação da morte e tipo de consentimento para utilização dos órgãos.
- 3) Assinale a opção que apresenta a intervenção de enfermagem indicada para o paciente com demência.
- (A) Solicitar várias coisas de uma vez.
 - (B) Não envolver os membros da família no tratamento.
 - (C) Evitar confrontações violentas.
 - (D) Evitar envolver o paciente no tratamento.
 - (E) Não fornecer relógio e calendários para evitar que o paciente fique ansioso e confuso.

- 4) Assinale a opção que, segundo Kawamoto(2003), apresenta uma atitude que NÃO deve ser adotada no momento da anotação de enfermagem.
- (A) Realizar o registro de dados à caneta.
 - (B) Utilizar o corretor para retificar os erros.
 - (C) Anotar em seguida à prestação do cuidado.
 - (D) Não deixar espaço entre o ponto e a assinatura.
 - (E) Preencher completamente o cabeçalho.
- 5) Em relação às características físicas da central de material esterilizado, é correto afirmar que os elementos que compõem essa unidade são:
- (A) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de material, sala para guarda e distribuição de material e área para guarda de macas.
 - (B) Sala para preparo de material, sala para esterilização e posto de enfermagem.
 - (C) Sala para esterilização, sala para guarda e distribuição de material e área para guarda de macas.
 - (D) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de material, sala para esterilização e sala para guarda e distribuição de material.
 - (E) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de material, sala para esterilização e local para lavabo.
- 6) Em relação ao conceito de drenagem torácica, pode-se afirmar que consiste na introdução de
- (A) um tubo dentro do pulmão, para retirar líquido ou ar a fim de ajudar a recuperar a pressão negativa.
 - (B) uma sonda dentro do tórax para retirar ar ou líquido a fim de recuperar a pressão positiva.
 - (C) um tubo dentro do espaço pleural, para retirar ar ou líquido a fim de ajudar a recuperar a pressão positiva.
 - (D) um tubo dentro do espaço pleural, para retirar ar ou líquido a fim de ajudar a recuperar a pressão negativa.
 - (E) um tubo dentro do espaço pleural para a introdução de oxigênio a fim de ajudar a recuperar a pressão positiva.

- 7) Na criança, a desidratação grave (3° grau) caracteriza-se por:
- (A) pele com turgidez.
 - (B) língua saburrosa.
 - (C) discreto sinal da prega.
 - (D) perda de peso entre 5 e 10%.
 - (E) fontanela muito funda.
- 8) As meningites são inflamações que acometem as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central. Por desencadearem processos inflamatórios, apresentam sintomas como:
- (A) cefaleias, febre, rigidez de nuca, vômitos em jatos, convulsões e vertigem.
 - (B) cefaleias, febre, rigidez de nuca, diarreia e incontinência urinária.
 - (C) cefaleia, febre, enjôo, desorientação e tremores nas mãos.
 - (D) hipertensão arterial, vômitos, convulsões e icterícia.
 - (E) cefaleia, febre, rigidez de nuca, enjôo e constipação.
- 9) Segundo Kawamoto (2003), a aplicação de calor tem as seguintes finalidades, EXCETO:
- (A) relaxar a musculatura.
 - (B) aquecer o paciente.
 - (C) estancar o sangramento.
 - (D) aliviar a dor.
 - (E) facilitar o processo supurativo.
- 10) Assinale a opção que apresenta a classificação das feridas por volume de exsudato.
- (A) Por incisão, por perfuração, por contusão, por escoriação, por veneno e térmicas.
 - (B) Secas, pós-sutura, pouco exsudativa, moderadamente exsudativa e altamente exsudativa.
 - (C) Asséptica, séptica, pouco exsudativa e altamente exsudativa.
 - (D) Asséptica, por incisão, por perfuração e altamente exsudativa.
 - (E) Secas, pós-sutura, asséptica, séptica e contaminada.

- 11) Qual é a manobra recomendada para aliviar a obstrução da via aérea por corpo estranho no adulto?
- (A) de Valsava.
 - (B) de Heimlich.
 - (C) de Frederich.
 - (D) de Henrich.
 - (E) de Reich.
- 12) Assinale a opção que apresenta somente itens que devem ser observados ao admitir um paciente para a cirurgia.
- (A) Se o paciente está em dieta zero e se dentaduras e próteses foram removidas.
 - (B) Se dentaduras e próteses foram removidas e se lentes de contato foram mantidas.
 - (C) Se o paciente está em dieta zero, se lentes de contatos foram removidas e se as próteses foram mantidas.
 - (D) Se o paciente está em dieta zero, se a preparação cutânea, quando prescrita, foi realizada e se as próteses foram mantidas.
 - (E) Se dentaduras e próteses foram removidas e se lentes de contato e aliança de casamento foram mantidas.
- 13) Em relação à aplicação de insulina, é correto afirmar que
- (A) deve-se escolher o local de aplicação e não usar álcool para limpar a pele, pois poderá interferir na ação da insulina.
 - (B) numa mesma área, deve-se usar aproximadamente uma distância de 8 a 10 centímetros para fazer as aplicações.
 - (C) os locais de aplicação deverão ser variados uma vez por semana.
 - (D) com a seringa, deve-se introduzir a agulha na pele formando um ângulo de 45 graus.
 - (E) os locais de aplicação poderão ser a região deltoide, região glútea, face anteroexterna da coxa, parede abdominal e cintura.

- 14) Com base nas vias de transmissão do vírus HIV citadas por Kawamoto *et al.* (2004), assinale a opção em que NÃO há evidências de transmissão do HIV.
- (A) Relação sexual vaginal.
 - (B) Transfusão sanguínea.
 - (C) Leite materno.
 - (D) Da mãe para o feto.
 - (E) Suor.
- 15) Em relação à dor pós-operatória, é correto afirmar que
- (A) a dor é um dos sintomas mais tardios que o paciente apresenta.
 - (B) a dor pós-operatória máxima ocorre entre 12 e 36 horas depois da cirurgia, e, em geral, diminui significativamente em torno de 48 horas.
 - (C) os idosos parecem ter uma tolerância menor à dor que os mais jovens ou de meia-idade.
 - (D) existe prova documentada de que homens toleram mais a dor que as mulheres.
 - (E) a dor pós-operatória máxima ocorre entre 6 e 12 horas depois da cirurgia e, em geral, diminui significativamente em torno de 36 horas.
- 16) O curativo seco é utilizado principalmente para o fechamento de ferida por primeira intenção. Assinale a opção que apresenta uma desvantagem deste tipo de curativo.
- (A) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela umidade e o risco de infecção pode aumentar.
 - (B) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela umidade e as roupas de cama tornam-se molhadas.
 - (C) Aderem à superfície da ferida quando a drenagem seca. A retirada pode provocar dor e ruptura do tecido de granulação.
 - (D) Não aderem à superfície da ferida quando a drenagem seca.
 - (E) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela umidade, o risco de infecção pode aumentar e as roupas de cama tornam-se molhadas.

- 17) Considerando os tipos de cirurgia, assinale a opção que corresponde ao tempo máximo que pode ser esperado para resolver uma cirurgia de urgência.
- (A) 10 a 12 horas.
 - (B) 12 a 24 horas.
 - (C) 24 a 36 horas.
 - (D) 24 a 48 horas.
 - (E) 24 a 72 horas.
- 18) Assinale a opção que apresenta as quatro formas de manifestação da hanseníase.
- (A) Tuberculoide, dimorfa, tetânica e viral.
 - (B) Indeterminada, virchowiana, dimorfa e viral.
 - (C) Indeterminada, virchowiana, tuberculoide e dimorfa.
 - (D) Tuberculoide, tetânica, hipocrômica e indeterminada.
 - (E) Hipocrômica, indeterminada, bacteriana e dimorfa.
- 19) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com idade a partir de quantos anos?
- (A) 55
 - (B) 60
 - (C) 65
 - (D) 70
 - (E) 75
- 20) As lesões abdominais contribuem com grande percentual das lesões e morte relacionadas ao trauma. Assinale a opção que traz uma intervenção primária nos traumas abdominais.
- (A) Evitar manobras de ressuscitação, pois não são indicadas em traumas abdominais.
 - (B) Avaliar a via aérea e verificar níveis de glicose no sangue.
 - (C) Controlar o sangramento com curativos compressivos na região abdominal completa.
 - (D) Quando existir objeto empalado no abdome, retirá-lo cuidadosamente e aplicar curativo compressivo.
 - (E) Quando existir objeto empalado no abdome, deve-se deixá-lo nesse local e estabilizar esse objeto com curativo volumoso ao longo dos lados do objeto.

- 21) Como se denomina o tipo de precaução aplicável para contato com sangue, fluido corporal, pele não intacta e membranas mucosas de todos os pacientes?
- (A) De contato.
 - (B) Respiratória.
 - (C) De aerossóis.
 - (D) Padrão.
 - (E) Protetora.
- 22) Quais são os fatores que afetam a cicatrização normal?
- (A) Idade, raça, sexo e condição social.
 - (B) Idade, nutrição, condição de vascularização, edema e inflamação do local.
 - (C) Idade, nutrição, condição de vascularização e raça.
 - (D) Nutrição, edema, inflamação do local e sexo.
 - (E) Idade, nutrição, condição de vascularização, edema e condição social.
- 23) Como se denomina a disfunção do tubo neural que se caracteriza pela protusão herniária de um cisto saculiforme contendo meninges, líquido cefalorraquidiano e uma porção da medula com seus nervos?
- (A) Mielomeningocele.
 - (B) Exencefalia.
 - (C) Espinha bífida oculta.
 - (D) Encefalocele.
 - (E) Meningocele.
- 24) Assinale a opção que apresenta finalidades do curativo.
- (A) Evitar a descontaminação das feridas limpas e facilitar a cicatrização.
 - (B) Facilitar a circulação geral e a cicatrização.
 - (C) Promover a infecção das lesões contaminadas e a cicatrização por segunda intenção.
 - (D) Evitar a contaminação das feridas limpas e facilitar a cicatrização.
 - (E) Promover o conforto do paciente e a infecção das lesões contaminadas.

- 25) Assinale a opção que apresenta o agente etiológico da Tuberculose.
- (A) Plasmodium vivax.
 - (B) Bacilo de Koch.
 - (C) Bacilo de Hansen.
 - (D) Clostridium tetani.
 - (E) Ascaris lumbricóides.
- 26) Com o objetivo de prevenir ou minimizar as reações das crianças, principalmente as menores de 5 anos, ocasionadas pelo medo da separação dos pais durante a hospitalização, alguns hospitais adotam a seguinte conduta:
- (A) sedar levemente a criança nos dias iniciais da internação.
 - (B) permitir a participação da família nos cuidados.
 - (C) evitar a participação da criança em atividades recreativas.
 - (D) recolher os objetos familiares trazidos pela criança.
 - (E) estabelecer dias e horários para visita dos pais.
- 27) Assinale a opção que indica cuidados de enfermagem ao paciente no período pré-operatório de cirurgia ambulatorial.
- (A) Administrar medicamentos pós-anestésicos e verificar os sinais vitais.
 - (B) Oferecer dieta leve e verificar os sinais vitais.
 - (C) Oferecer dieta branda e verificar os sinais vitais.
 - (D) Verificar os sinais vitais e administrar medicamentos pré-anestésicos.
 - (E) Administrar oxigênio e oferecer líquidos.
- 28) Assinale a opção que apresenta as principais características dos transtornos psicóticos.
- (A) Desorganização da personalidade, alteração do pensamento e comportamento, afastamento da realidade e atividade delirante.
 - (B) Tristeza vital, angústia, retraimento social e baixa autoestima.
 - (C) Desorientação de tempo e espaço, tremores de mãos e braços e alucinações visuais.
 - (D) Tendência a fazer gastos excessivos, exaltação do humor, otimismo e confiança exagerados.
 - (E) Insônia, hipersexualidade e agitação psicomotora.

- 29) Assinale a opção que apresenta uma consideração de enfermagem em relação à coleta de fezes para exames.
- (A) Utilizar um abaixador de língua para preencher completamente de fezes um recipiente plástico descartável.
 - (B) Preservar a amostra de material fecal quando ela contiver vermes ou sangue.
 - (C) Os frascos de fezes devem ser congelados quando for impossível enviá-los rapidamente ao laboratório.
 - (D) Testar para sangue oculto ou confirmar a melena ou sangue macroscopicamente visível utilizando o teste de nidrina.
 - (E) Sempre refrigerar as amostras que devem ser examinadas para parasitas. Neste caso, as fezes não devem estar frescas.
- 30) Hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus, tendo como órgão alvo o fígado. Assinale a opção que apresenta a forma de transmissão do vírus da Hepatite A.
- (A) Relação sexual.
 - (B) Transfusão sanguínea.
 - (C) Fecal-oral.
 - (D) Transfusão perinatal.
 - (E) Picada de mosquito.
- 31) O delirium tremens é uma das complicações psiquiátricas decorrentes do alcoolismo. Assinale a opção que apresenta os sintomas desse quadro.
- (A) Insônia, sudorese intensa, tremores generalizados e desinibição.
 - (B) Desorientação de tempo e espaço, alucinações visuais, tremores nas mãos e braços, delírios e ideias de perseguição.
 - (C) Autismo, inadequação comportamental, otimismo exagerado e alucinações visuais.
 - (D) Tremores nas mãos e braços, desorientação de tempo e espaço, hipersexualidade e desinibição.
 - (E) Insônia, tremores de membros inferiores, autismo e risos imotivados.

- 32) Até que idade, em meses, deverá ser feita a medida do perímetro cefálico nas crianças que vêm apresentando desenvolvimento físico normal?
- (A) 12
 - (B) 18
 - (C) 24
 - (D) 30
 - (E) 36
- 33) De acordo com o calendário básico de vacinação, recomenda-se a aplicação da segunda dose da vacina contra hepatite B quando a criança estiver com a idade de:
- (A) 1 mês.
 - (B) 2 meses.
 - (C) 3 meses.
 - (D) 4 meses.
 - (E) 6 meses.
- 34) Para aplicar 1500 UI de heparina, dispondo de frascos de 5000 UI/ml, quanto deve ser aspirado, em ml, para cumprir corretamente a prescrição?
- (A) 0,15
 - (B) 0,20
 - (C) 0,25
 - (D) 0,30
 - (E) 0,35
- 35) Assinale a opção que, segundo Hockenberry (2006), apresenta um sinal de desenvolvimento motor relativo ao 4º mês de vida.
- (A) Agarra e manipula pequenos objetos.
 - (B) Ajusta sua postura para alcançar um objeto.
 - (C) Transfere objetos de uma mão para outra.
 - (D) Tenta alcançar objetos com a mão, esticando-se.
 - (E) Segura um cubo enquanto procura outro.

- 36) Assinale a opção que apresenta somente contra-indicações de aspiração naso-traqueal.
- (A) Hipertensão arterial e arritmias.
 - (B) Hipotensão arterial e bradicardia.
 - (C) Distúrbios hemorrágicos e lesões da cabeça, facial ou cervical.
 - (D) Hipertensão arterial e cirurgia traqueal.
 - (E) Lesões da cabeça, facial ou cervical e arritimias.
- 37) Qual é a terminologia que tem relação com a característica frequência do pulso?
- (A) Filiforme.
 - (B) Dicrotíco.
 - (C) Taquicárdico.
 - (D) Cheio.
 - (E) Disrítmico.
- 38) A consulta pré-natal de uma gestante com 35 semanas deve ocorrer:
- (A) a cada 2 meses.
 - (B) uma vez por mês.
 - (C) a cada 15 dias.
 - (D) uma vez por semana.
 - (E) duas vezes por semana.
- 39) Induzir o parto é provocar de maneira artificial o desencadeamento das contrações uterinas. Assinale a opção que apresenta uma contra-indicação absoluta desse procedimento.
- (A) Pós-datismo.
 - (B) Aminiorrexe prematura.
 - (C) Inércia uterina primária.
 - (D) Cicatriz uterina anterior.
 - (E) Desproporção feto pélvica.
- 40) Segundo Lima (2010), é considerado um cuidado imediato ao recém-nascido prematuro:
- (A) mudar decúbito.
 - (B) prover aquecimento.
 - (C) fazer curativo do coto.
 - (D) higienizar a pele.
 - (E) iniciar alimentação.

- 41) Uma forma aguda de pneumonia pode ser produzida pela inalação de secreções orofaríngeas e/ou o conteúdo gástrico para dentro dos pulmões. Assinale a opção que apresenta uma intervenção de enfermagem para prevenir este tipo de pneumonia.
- (A) Elevar a cabeceira do leito para os pacientes debilitados, os que recebem alimentação por sonda e aqueles com doenças motoras do esôfago.
 - (B) Colocar os pacientes com reflexos comprometidos em uma posição dorsal.
 - (C) Garantir que a sonda nasogástrica esteja impermeável.
 - (D) Manter os pacientes debilitados, os que recebem alimentação por sonda e aqueles com doenças motoras do esôfago em posição dorsal.
 - (E) Fornecer lentamente as alimentações por sonda, com o paciente em Trendelenburgo.
- 42) Transtorno afetivo caracterizado por oscilação grave e patológica do humor, manifesto por meio de quadros de depressão e mania. A descrição acima refere-se ao quadro de:
- (A) depressão.
 - (B) esquizofrenia.
 - (C) transtorno de ansiedade generalizada.
 - (D) transtorno bipolar.
 - (E) transtorno obsessivo-compulsivo.
- 43) Os medicamentos indicados na facilitação da evacuação são denominados
- (A) constipantes.
 - (B) antiácidos.
 - (C) antieméticos.
 - (D) catárticos.
 - (E) antiespasmódicos.
- 44) Quantas horas, aproximadamente, são necessárias para completar uma infusão de 1500 ml de soro, utilizando um equipo de macrogotas (20 gts = 1 ml) com gotejamento de 60 gts/mim?
- (A) 5
 - (B) 6
 - (C) 7
 - (D) 8
 - (E) 9

- 45) O distúrbio da personalidade antissocial caracteriza-se por:
- (A) desconfiança pervasiva e suspeita dos outros.
 - (B) impulsividade acentuada e instabilidade nos relacionamentos interpessoais, autoimagem e afeto.
 - (C) emocionalidade excessiva e busca de atenção.
 - (D) desprendimento dos relacionamentos sociais e pouca expressão das emoções nos ambientes interpessoais.
 - (E) desconsideração e violação dos direitos dos outros.
- 46) Considerando a organização dos serviços de saúde por complexidade, assinale a opção que NÃO representa um serviço primário de saúde.
- (A) Ambulatório especializado.
 - (B) Postos de saúde.
 - (C) Pronto atendimento.
 - (D) Unidade sanitária.
 - (E) Pronto-socorro.
- 47) O escarro pode ser obtido por diversos métodos, um deles é através da respiração profunda e tosse. Em relação a esse método, é correto afirmar que o profissional de enfermagem deve:
- (A) instruir o paciente a fazer várias respirações superficiais, expirar e realizar uma série de tosses longas.
 - (B) aspirar a secreção através do tubo endotraqueal.
 - (C) aspirar a secreção através da traqueostomia.
 - (D) fazer com que o paciente tussa profundamente e expectore o escarro em um recipiente estéril.
 - (E) obter a primeira amostra vespertina, pois fornece a melhor amostra das secreções pulmonares.
- 48) De acordo com Oguisso e Schmidt (2007), "o respeito que a sociedade terá ao enfermeiro só se justificará se, além de o sentir capaz, o souber responsável". Assinale a opção que apresenta as três esferas em que o profissional de enfermagem poderá ser responsabilizado.
- (A) Fiscal, penal e ética.
 - (B) Penal, deontológica e técnica.
 - (C) Civil, moral e ética.
 - (D) Penal, profissional e pessoal.
 - (E) Civil, penal e profissional.

- 49) Assinale a opção que apresenta sintomas do hipotireoidismo.
- (A) Insônia, raciocínio lento e sensibilidade ao frio.
 - (B) Insônia, raciocínio rápido, fraqueza, aumento de peso e pés frios.
 - (C) Sonolência, raciocínio lento, bradicardia, hipotensão, aumento de peso, pés frios e edema.
 - (D) Sonolência, raciocínio lento, taquicardia, hipotensão, aumento de peso e pés frios.
 - (E) Sonolência, raciocínio lento, taquicardia, hipertensão, aumento de peso e pés frios.
- 50) Em uma gestante com hemorragia indolor, sem causa aparente, eliminando sangue vivo e sem coágulos, deve-se suspeitar de:
- (A) descolamento prematuro de placenta.
 - (B) placenta prévia.
 - (C) aminiorrexe prematura.
 - (D) trabalho de parto prematuro.
 - (E) hiperêmese gravídica.