

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

**(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO DE  
MÉDICOS NO CORPO DE SAÚDE DA  
MARINHA / CP-CSM-MD/2014)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**QUADRO DE MÉDICOS**

- 1) Qual é a patologia cirúrgica abdominal mais comum encontrada durante a gravidez?
  - (A) Apendicite aguda.
  - (B) Colecictite aguda.
  - (C) Pancreatite biliar.
  - (D) Obstrução intestinal.
  - (E) Diverticulite aguda.
  
- 2) Amenorreia, anovulação crônica, infertilidade, ganho ponderal e hirsutismo sugerem o diagnóstico de:
  - (A) adenomiose.
  - (B) mioma intramural.
  - (C) síndrome de ovários policísticos.
  - (D) doença inflamatória pélvica.
  - (E) vulvovaginite.
  
- 3) Quanto ao tratamento das fraturas expostas, é correto afirmar que:
  - (A) Antibióticoterapia não é necessário.
  - (B) Um litro de soro fisiológico é suficiente para irrigação cirúrgica.
  - (C) Feridas com 1cm não caracterizam exposição óssea.
  - (D) Não se trata de emergência ortopédica.
  - (E) O desbridamento cirúrgico deve ser feito imediatamente.
  
- 4) A deficiência de ferro é uma das formas mais prevalentes de anemia. Globalmente, 50% das anemias são atribuídas à deficiência de ferro, assim sendo, levando-se em consideração a morfologia dos eritrócitos, como se classifica a anemia ferropriva?
  - (A) Normocrômica e microcítica.
  - (B) Hipocrômica e microcítica.
  - (C) Hipercrômica e microcítica.
  - (D) Hipercrômica e macrocítica.
  - (E) Hipocrômica e macrocítica.

- 5) Qual é o Sinal/sintoma que caracteriza eclâmpsia e que não está presente na pré-eclâmpsia?
- (A) Cefaleia.  
(B) Hipotensão.  
(C) Edema.  
(D) Crise convulsiva.  
(E) Hipertensão arterial.
- 6) A origem mais comum do abscesso hepático é:
- (A) da veia porta.  
(B) da artéria hepática.  
(C) do trauma.  
(D) da infecção sistêmica.  
(E) da árvore biliar.
- 7) Sobre a síndrome do cólon irritável, é correto afirmar que:
- (A) é um distúrbio funcional caracterizado por dor, desconforto abdominal e alteração dos hábitos intestinais.  
(B) o diagnóstico é feito através de marcadores clínicos específicos e, em alguns casos, a biópsia se faz necessária.  
(C) a síndrome é uma patologia pouco comum na prática clínica e é mais prevalente em homens.  
(D) a intensidade dos sintomas não costuma ser muito variáveis e, geralmente, afetam a qualidade de vida dos pacientes.  
(E) os critérios de Roma II descrevem o aspecto da macroscopia das lesões encontrado na coloscopia.
- 8) Qual é o agente etiológico mais comum da pneumonia na criança?
- (A) *Streptococcus pneumoniae*.  
(B) *Pseudomonas aeruginosa*.  
(C) *Staphylococcus aureus*.  
(D) *Escherichia coli*.  
(E) *Pneumocystis jirovecii*.

- 9) Homem com 30 anos, chega ao serviço de emergência muito ansioso com resultado de alguns exames: Anti-HAV IgG reagente, Anti-HAV IgM não reagente, Anti-HCV não reagente, HbsAg não reagente, Anti-Hbs reagente, Anti-Hbc não reagente e anti-Hbe não reagente. Sendo assim, é correto afirmar que o paciente
- (A) esteve em contato com hepatite A.  
(B) não foi vacinado para hepatite B.  
(C) já teve contato com vírus da hepatite C.  
(D) foi adequadamente vacinado.  
(E) está em curso de hepatite A.
- 10) A toxemia gravídica caracteriza-se pela triade:
- (A) hipertensão, edema e proteinúria.  
(B) edema, poliúria e hipotensão.  
(C) edema, hipertensão e hiperglicemias.  
(D) proteinúria, hipertensão e glicosúria.  
(E) cefaleia, glicosúria e hipertensão.
- 11) Assinale a opção que apresenta um importante fator de risco para câncer de mama.
- (A) História familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau (mãe ou irmã).  
(B) Diabetes.  
(C) Hipertensão.  
(D) Gravidez.  
(E) Sedentarismo.
- 12) Assinale a opção que apresenta uma indicação de colangiografia intraoperatória.
- (A) Enzimas hepáticas normais.  
(B) Coléodo fino à imagem pré-operatória, com cálculos grandes na vesícula.  
(C) Pancreatite biliar com estudo endoscópico do coléodo prévio.  
(D) Suspeita de lesão intra-operatória das vias biliares.  
(E) Anatomia bem definida durante a dissecação laparoscópica.

- 13) Durante exame físico ginecológico, qual achado sugere o diagnóstico de doença inflamatória pélvica?
- (A) Secreção vaginal fisiológica.  
(B) Dor à palpação dos órgãos pélvicos.  
(C) Aumento de volume uterino.  
(D) Metrorragia intensa.  
(E) Condiloma.
- 14) O aleitamento materno possui vantagens práticas e psicológicas. Portanto, todas as mães devem ser estimuladas a amamentar seus bebês ao seio. Sobre o tema, assinale a opção correta.
- (A) No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida.  
(B) Recomenda-se amamentar os bebês, mesmo se a lactante for HIV positiva.  
(C) O leite humano não contém anticorpos bacterianos e virais.  
(D) O reinício da menstruação deve desencorajar a continuação da amamentação.  
(E) O aleitamento materno está associado a uma maior incidência de problemas alimentares relacionados à alergia.
- 15) Pela American Society of Anesthesiology, paciente com doença sistêmica que resulta em debilidade funcional é classificado como ASA:
- (A) I  
(B) II  
(C) III  
(D) IV  
(E) V
- 16) Como se denomina a hérnia de parede abdominal que se caracteriza pela protusão de órgão ou tecidos através da linha semilunar ou arqueada de Douglas?
- (A) Spiegel.  
(B) Femural.  
(C) Littré.  
(D) Deslizamento.  
(E) Inguinal direta.

- 17) Qual é o grau de uma lesão em que a queimadura atinge a epiderme e a derme?
- (A) Primeiro.  
(B) Segundo.  
(C) Terceiro.  
(D) Quarto.  
(E) Quinto.
- 18) A disparidade em pulsação e pressão arterial nos braços e pernas associada a pulsos femorais fracos (ou ausentes em até 40% dos pacientes) em contraste com os pulsos latejantes dos vasos dos braços e carótida, em recém-nascido, possibilita a hipótese diagnóstica de:
- (A) subluxação congênita de quadril.  
(B) coarctação da aorta.  
(C) tetralogia de Fallot.  
(D) comunicação interatrial.  
(E) paralisia infantil.
- 19) A convulsão febril simples é a condição epiléptica mais comum da infância. Sobre ela, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Ocorre independentemente da idade da criança, sendo mais comum entre os maiores de 9 anos.  
(B) Antecedentes familiares positivos de crises febris em irmãos e nos pais sugerem predisposição genética.  
(C) Geralmente se associa a um nível de temperatura que aumenta rapidamente até 39°C ou mais.  
(D) O estado de mal epiléptico costuma ser causado por infecção do sistema nervoso central.  
(E) A conduta de rotina para um lactente normal com crises convulsivas febris simples e breves inclui pesquisa cuidadosa da causa da febre e tranquilização e orientação dos pais.
- 20) Culdocentese é o procedimento caracterizado pela punção:
- (A) de abscesso mamário.  
(B) de cisto mamário.  
(C) da cavidade amniótica.  
(D) do fígado.  
(E) do fundo de saco de Douglas.

21) Sobre luxações, assinale a opção correta.

- (A) A luxação simples do ombro geralmente necessita de redução aberta.
- (B) A luxação do cotovelo é a mais rara de ocorrer.
- (C) A luxação do joelho pode estar associada à lesão da artéria poplítea.
- (D) Geralmente, a patela luxa medialmente.
- (E) A luxação do quadril não constitui emergência ortopédica.

22) O teste imunológico para diagnóstico da gravidez detecta a excreção de:

- (A) estradiol.
- (B) progesterona.
- (C) ocitocina.
- (D) gonadotrofina coriônica humana.
- (E) testosterona.

23) Com relação à terapia oral para Diabetes, assinale a opção INCORRETA:

- (A) A acarbose diminui a absorção da glicose e auxilia na redução da glicemia pós prandial.
- (B) As sulfonilureias têm como mecanismo de ação o aumento da secreção de insulina. Sendo assim a hipoglicemia é um efeito colateral raro.
- (C) A metformina reduz a produção de glicose hepática e frequentemente está relacionada à perda de peso e à intolerância gástrica.
- (D) As tiazolidinedionas reduzem a resistência à insulina e têm como contraindicação doença hepática e insuficiência cardíaca.
- (E) As sulfonilureias de segunda e terceira geração são drogas mais seguras com menos chance de efeitos colaterais.

24) A vacina anti-Rh está indicada no pós-parto para prevenção da doença hemolítica perinatal nos casos de:

- (A) mãe Rh positivo e RN Rh positivo.
- (B) mãe Rh positivo e RN Rh negativo.
- (C) mãe Rh negativo e RN Rh negativo.
- (D) mãe Rh negativo e RN Rh positivo.
- (E) mãe Rh positivo e RN Rh positivo ou negativo.

- 25) Com relação à bronquiolite aguda, é correto afirmar que:
- (A) sempre se deve internar lactentes portadores de bronquiolite aguda.
  - (B) é comumente causada por agentes não-virais.
  - (C) é mais comum em lactentes amamentados ao seio materno.
  - (D) deve ser tratada com corticoide sistêmico.
  - (E) o vírus sincicial respiratório é responsável por mais de 50% dos casos.
- 26) A avaliação inicial do paciente com escoliose idiopática do adolescente deve incluir:
- (A) ressonância magnética.
  - (B) provas reumatológicas.
  - (C) cintilografia óssea.
  - (D) exame físico e neurológico completo.
  - (E) eletroneuromiografia.
- 27) Qual das opções abaixo apresenta indicação para realização de tomografia computadorizada de abdome no trauma?
- (A) Clara indicação para laparotomia.
  - (B) Instabilidade hemodinâmica.
  - (C) Trauma abdominal fechado, com paciente estável.
  - (D) Agitação.
  - (E) Alergia ao meio de contraste.
- 28) Criança com 10 anos de idade, portadora de leucemia mieloide aguda, encontra-se internada em uma enfermaria de oncologia pediátrica. Iniciou febre há 3 dias, quando surgiram vesículas em membros e tronco, sugestivas de varicela. Qual a conduta a ser adotada nas demais crianças internadas nessa enfermaria?
- (A) Observar, pois já foram passadas 72 horas de contato.
  - (B) Aplicar a vacina antivaricela.
  - (C) Aplicar a imunoglobulina antivaricela.
  - (D) Aplicar a vacina e a imunoglobulina antivaricela.
  - (E) Dar alta para as demais crianças.

- 29) Qual substância é formalmente contraindicada durante a gestação?
- (A) Talidomida.  
(B) Dipirona.  
(C) Amoxicilina.  
(D) Paracetamol.  
(E) Ácido fólico.
- 30) De todas as características visíveis da membrana timpânica, qual das abaixo citadas é a mais sensível e específica para determinar o diagnóstico de Otite Média Aguda?
- (A) Aumento da vascularização.  
(B) Mobilidade / abaulamento.  
(C) Perda do triângulo luminoso.  
(D) Hiperemia.  
(E) Opacidade.
- 31) Assinale a opção que apresenta uma complicaçāo tardia após fratura supracondilar de úmero em crianças.
- (A) Neuropraxia.  
(B) Síndrome compartimental.  
(C) Infecção.  
(D) Cúbito varo.  
(E) Luxação acrōmioclavicular.
- 32) São fatores de risco para fratura osteoporótica, EXCETO:
- (A) baixo peso.  
(B) cor branca.  
(C) fratura prévia na idade adulta.  
(D) tabagismo.  
(E) atividade física.
- 33) A síndrome nefrótica é essencialmente uma doença pediátrica, sendo 15 vezes mais comum em crianças que em adultos. Os aspectos característicos da síndrome nefrótica são:
- (A) hipertensão arterial, edema, hiperglycemia.  
(B) hipercalcemias, hiperglycemia, hipertensão arterial.  
(C) edema, hipocalemia, hipertensão arterial.  
(D) hipotensão arterial, proteinúria, hiperglycemia.  
(E) edema, hiperlipidemia, hipoalbuminemia.

- 34) Com relação à osteomielite aguda hematogênica, é INCORRETO afirmar que:
- (A) a contagem de leucócitos muitas vezes é normal.  
(B) abscessos sequestrados exigem drenagem cirúrgica.  
(C) é o tipo mais comum de infecção óssea.  
(D) estreptococcus grupo B é o organismo infectante mais provável em adultos.  
(E) em crianças com menos de 2 anos, alguns vasos sanguíneos cruzam a fise e podem disseminar infecção para epífese.
- 35) Sobre a Doença de Parkinson, é correto afirmar que:
- (A) as alterações cognitivas acontecem antes das alterações motoras.  
(B) a depressão não está comumente associada à doença.  
(C) o diagnóstico é estabelecido a partir de marcadores específicos.  
(D) as manifestações clínicas mais comuns são: bradicinesia, tremor em repouso, rigidez e alteração de marcha.  
(E) o tratamento deve ser instituído precocemente e nunca deve ser feito em monoterapia.
- 36) Qual a técnica de cirurgia bariátrica em que o mecanismo de ação é amplamente restritivo com má absorção discreta?
- (A) Desvio pancreático.  
(B) Derivação gástrica em Y de Roux.  
(C) Exclusão duodenal.  
(D) Gastoplastia vertical em banda.  
(E) Colocação de banda gástrica ajustável laparoscópica.
- 37) Com relação às fraturas do quadril, assinale a opção correta.
- (A) Fratura do colo do fêmur é mais comum em homens.  
(B) O estágio I de Garden representa a fratura completa.  
(C) Artroplastia é o único método de tratamento.  
(D) Na fratura do colo do fêmur, o tratamento cirúrgico deve ser feito assim que possível.  
(E) Nos pacientes jovens, estão associadas à trauma de baixa energia.

- 38) A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia de alta prevalência e de íntima relação com o hábito do tabagismo, sendo caracterizada por hiperreatividade das vias aéreas e por períodos de estabilidade e exacerbações. O período de exacerbação é marcado por:
- (A) febre, piora da dispneia e melhora da tosse.  
(B) Inapetência, piora da tosse e ausência de secreção.  
(C) aumento da secreção, secreção clara e fluida, além de anorexia.  
(D) anorexia, melhora da dispneia e aumento da tosse.  
(E) piora da tosse e da dispneia, além de aumento do volume da secreção.
- 39) Mulher com 60 anos, sabidamente hipertensa, em uso de losartan 50mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25mg pela manhã, anlodipino 5mg 2 vezes ao dia, carbonato de cálcio 600mg 2 vezes ao dia e clonazepam 1mg à noite, procura serviço de emergência com queixa de edema de membros inferiores. Esse edema provavelmente está relacionado ao uso de qual medicação?
- (A) Losartan.  
(B) Anlodipino.  
(C) Clonazepan.  
(D) Carbonato de cálcio.  
(E) Hidroclorotiazida.
- 40) Mulher com 45 anos chega à emergência de um hospital terciário, acompanhada pelo esposo, com relato de perda súbita de consciência, precedida de uma cefaleia referida como "a pior dor de cabeça da vida". O exame físico não demonstrou déficit focal. A conduta a ser adotada é:
- (A) realizar imediatamente punção lombar e iniciar antibiótico de amplo espectro.  
(B) realizar Tomografia de crânio e encaminhar para vigilância neurológica no CTI.  
(C) realizar analgesia com dipirona e liberar com orientação de procurar neurologista.  
(D) solicitar exames laboratoriais para afastar a possibilidade de meningite.  
(E) fazer ressonância nuclear magnética de crânio e aguardar especialista.

- 41) Com relação aos tumores malignos do reto, qual é o mais frequente?
- (A) Sarcoma.  
(B) Adenocarcinoma.  
(C) Linfoma.  
(D) Carcinoide.  
(E) Melanoma.
- 42) A discopatia cervical tem indicação cirúrgica quando o paciente:
- (A) apresenta melhora com tratamento conservador.  
(B) tem déficit neurológico progressivo.  
(C) queixa-se de cefaleia.  
(D) apresenta alteração de reflexo patelar.  
(E) não tiver resposta com a tração cervical.
- 43) Com relação à lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, é correto afirmar que:
- (A) o tratamento conservador é uma opção.  
(B) a punção articular tem que ser feita imediatamente.  
(C) as mulheres são mais acometidas que os homens.  
(D) crianças não apresentam esse tipo de lesão.  
(E) é mais rara que a lesão do ligamento cruzado posterior.
- 44) Paciente de 25 anos, sexo masculino, com dor progressiva em topografia de fêmur distal, apresentando nas radiografias da região lesão agressiva, mal definida, metafisária com reação periosteal. Assinale a opção que apresenta o provável diagnóstico.
- (A) Fratura por estresse.  
(B) Osteossarcoma.  
(C) Doença de Paget.  
(D) Mieloma múltiplo.  
(E) Cisto de Baker.
- 45) A maioria dos corpos estranhos nas vias aéreas se aloja:
- (A) no Brônquio esquerdo.  
(B) nas narinas.  
(C) na laringe.  
(D) na traqueia.  
(E) no Brônquio direito.

- 46) Com relação ao manuseio de um paciente vítima de acidente automobilístico com lesão do anel pélvico, é correto afirmar que:
- (A) devem ser tomadas todas as medidas dos protocolos traumatólogicos existentes.
  - (B) a tomografia deve ser feita antes mesmo de realizar radiografias.
  - (C) em pacientes com instabilidade hemodinâmica, é indicada observação por 24hs.
  - (D) não é necessário realizar exames vaginal e retal em pacientes com fratura exposta de bacia.
  - (E) imediatamente após a lesão, a mortalidade é decorrente de falência de múltiplos órgãos.
- 47) Qual é a neoplasia abdominal mais comum em crianças?
- (A) Neuroblastoma.
  - (B) Tumor de Wilms.
  - (C) Rabdomiossarcoma.
  - (D) Hepatoblastoma.
  - (E) Teratoma.
- 48) Qual manifestação clínica é mais consistente para classificar uma criança como portadora de pneumonia?
- (A) Sibilância.
  - (B) Aumento da frequência respiratória.
  - (C) Estridor.
  - (D) Tiragem subcostal.
  - (E) Tosse.
- 49) Qual vírus está diretamente relacionado ao câncer de colo uterino?
- (A) CMV.
  - (B) H1N1.
  - (C) HPV.
  - (D) HTLV 1 e 2.
  - (E) HIV.

- 50) A nefrite lúpica é uma das manifestações do lúpus eritematoso sistêmico. Qual é o anticorpo que está fortemente relacionado à nefrite?
- (A) Anticardiolipina.
  - (B) Anti-DNA.
  - (C) Anti-SSA (RO).
  - (D) Anti-SM.
  - (E) Anti-P.